Erratum

Versorgungsforschungsstudie zur Lebensqualität und zu pharmakoökonomischen Aspekten von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen unter Therapie mit Oxycodon/Naloxon oder anderen Opioiden der WHO-Stufe III

Zwischenauswertung

R. Rychlik, P. Kiencke, J. Kresimon

Institut für Empirische Gesundheitsökonomie, Burscheid

Gesundh ökon Qual manag 2011; 16: S10 – S19

Durch ein Versehen wurden die Zahlen für „Mittelwert Kohorte OXN V1- > V3“ und „Mittelwert Kohorte OXN V1- > V4“ in Tab. 5 auf Seite S15 Supplement S1/11 der Zeitschrift Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement leider falsch wiedergegeben.

Beigefügt finden Sie die korrekte Tabelle:

Schmerzintensität	V1- > V3		V1- > V4	
	Kohorte OXN	Kohorte „andere starke Opiode“	Kohorte OXN	Kohorte „andere starke Opiode“
Anzahl Angaben	317	267	317	267
Mittelwert	4,9	2,9	6,3	3,4
Standardabweichung	7,2	5,6	9,0	6,7
Minimum	-17,0	-17,0	-16,0	-16,0
25%-Quartil	0,0	0,0	0,0	0,0
Median	4,0	2,0	5,0	3,0
75%-Quartil	9,0	6,0	11,5	7,0
Maximum	34,0	24,0	36,0	33,0
p-Wert (Kohorte OXN vs. „andere starke Opiode“)	0,002 (s.)		<0,001 (s.)	

Tab. 5 Verlauf der Schmerzintensität.