Broncholithiasis, Lithoptysis und broncho-ösophageale Fistel

Broncholithiasis, Lithoptysis and Broncho-oesophageal Fistula

Autoren

M. Westhoff¹, P. Litterst¹, F. Al-Shahrabani²

Institute

¹ Klinik für Pneumologie, Hemer

² Klinik für Thoraxchirurgie, Lungenklinik Hemer, Hemer

eingereicht 30. 7. 2011
akzeptiert nach Revision
15. 8. 2011

Bibliografie

DOI <http://dx.doi.org/10.1055/s-0031-1286633>
Online-Publikation: 2.11.2011
Pneumologie 2012; 66: 74–77
© Georg Thieme Verlag KG
Stuttgart · New York
ISSN 0934-8387

Korrespondenzadresse

Dr. Michael Westhoff
Klinik für Pneumologie
Lungenklinik Hemer
Theo-Funcciusstr. 1
58675 Hemer
Michael.Westhoff@lkhemer.de

Zusammenfassung

Broncho-ösophageale Fisteln bei Broncholithiasis sind extrem selten. Eine vorausgehende Lithoptysis wird nur vereinzelt beschrieben. Berichtet wird über einen 68-jährigen Patienten, der über eine mehr als 3 Jahre bestehende Hustensymptomatik klagte. 5 Monate vor der stationären Aufnahme trat eine Hämoptyse mit begleitendem Abhusten von mehreren gräulichen, bis zu 5 mm im Durchmesser großen Steinen auf. Bei der Bronchoskopie zeigte sich eine kleine Exkavation an der medialen Wand des linken Hauptbronchus. Im Vergleich zu einem vorausgegangenen CT konnte auf einem aktuellen CT eine kleine Fistel zwischen Ösophagus und linkem Hauptbronchus sowie eine nicht mehr vorhandene Kalzifikation in diesem Bereich nachgewiesen werden. Der Patient wurde linksseitig thorakomiert. Es erfolgte die Exzision der Fistel, Übernähung des Ösophagus und Interposition eines M. latissimus dorsi Lappens. Der Nachweis einer Broncholithwanderung mittels CT vor und nach der Lithoptyse, die Ausbildung einer linksseitigen Fistel und ihre Darstellung im CT sowie bei der Bronchoskopie wurden in dieser Kombination bislang nicht in der Literatur berichtet.

Einleitung

Ein persistierender Husten ist ein häufiges klinisches Symptom in der Pneumologie. Wenn dieses mit wiederkehrender Aspiration, mediastinaler Lymphknotenverkalkung und Abhusten von „Steinen“ assoziiert ist, müssen auch seltene Ursachen in Erwägung gezogen werden. Nachfolgend wird ein ungewöhnlicher Fall eines Patienten mit mediastinalen Lymphknotenverkalkungen vorgestellt, deren Wanderung in einer Broncholithiasis mit Lithoptysis und symptomatischer broncho-ösophagealer Fistel resultierte.

Abstract

Broncho-oesophageal fistulas in broncholithiasis are extremely rare. Preceding lithoptysis is only seen infrequently. We report on a 68-year-old patient who complained of cough for more than 3 years. 5 months prior to admission he had hemoptysis and expectorated several greyish stones of up to 5 mm diameter. Endoscopy revealed a small excavation at the medial wall of the left main bronchus. Compared to a former CT, an actual CT scan of the thorax showed a small fistula between the oesophagus and the left main bronchus and revealed a missing calcification at this site. The patient underwent a left-sided thoracotomy with excision of the fistula, suture of the oesophagus and interposition of a flap of the M. latissimus dorsi. The demonstration of broncholith migration with CT scans before and after lithoptysis, the development of a left-sided fistula and its demonstration in the CT scan as well as endoscopically have not been reported in this combination before.

Der Verlauf konnte klinisch und radiologisch dokumentiert werden.

Kasuistik

Anamnese

Der 68-jährige Patient beklagte seit etwa 3 Jahren einen persistierenden Husten. Deshalb erfolgte im Juni 2008 eine Diagnostik in einer auswärtigen Klinik. Das CT zeigte Verkalkungen der mediastinalen Lymphknoten (Abb. 1 a u. b). In einer polypoiden Struktur des rechten Hauptbronchus fanden sich epitheloidzellartige Granulome und

Abb. 1 a, b CT-Thorax 6/2008. Nachweis von Verkalkungen in mediastinalen Lymphknoten.

Abb. 2 Abgehusteter Broncholith.

Nekrosen. Im Verlauf persistierte der Husten nach Trinken von Flüssigkeiten. Im Dezember 2008 hustete der Patient blutiges Sekret und mehrere bis zu 5 mm große gräuliche Steine ab (● Abb. 2), die er zur stationären Aufnahme im Mai 2009 mitbrachte.

Klinischer Befund

Der klinische Untersuchungsbefund war regelrecht. Über den Lungen konnte reines Vesikuläratmen auskultiert werden.

Labor

CRP und klinisches Routinelabor (Blutbild, Leber- und Nierenwerte) boten keine Auffälligkeiten.

Endoskopie (Laryngoskopie und Bronchoskopie)

Es bestand ein unauffälliger Larynxbefund mit normaler Stimmwandbeweglichkeit. In der medialen Wand des linken Hauptbronchus bestand eine winzig kleine Exkavation (● Abb. 3). Aufgrund der Angabe von Hustenattacken nach Trinken von Flüssigkeiten erfolgte eine Laryngoskopie beim Trinken von gefärbter Flüssigkeit. Diese wurde nach dem ersten Schluckakt abgehustet.

Computertomografie

Das Kontroll-CT zeigte im Vergleich zum Vor-CT aus dem Jahr 2008 eine kleine Fistel zwischen Ösophagus und linkem Hauptbronchus (● Abb. 4 a u. b). Gegenüber dem Vor-CT fehlte in der LK-Station 7 ein Kalkfragment (● Abb. 5 a u. b).

Therapie

Bei endoskopisch und radiologisch nachgewiesener und klinisch eindeutig symptomatischer broncho-ösophagealer Fistel bestand die Indikation zur operativen Fistelsanierung. Therapeutisch erfolgte die Thorakotomie links mit Fistelexzision, Ösophagusübernähtung und Latissimus-Interponationsplastik. Im Verlauf war der Patient asymptomatisch. TB-Kulturen von Sekret und intraoperativen Abstrichen waren negativ.

Diskussion

Die in der Kasuistik beschriebene klinische Symptomatik ist pathognomonisch für eine Broncholithiasis mit begleitender aerodigestiver Fistel. Abgesehen vom klinischen Verlauf stellen der Nachweis einer Broncholithwanderung mittels CT vor und nach der Lithoptyse, die Ausbildung einer linksseitigen Fistel und ihre Darstellung im CT sowie bei der Bronchoskopie eine Besonderheit dar, die in dieser Kombination bislang nicht in der Literatur berichtet wurde.

Eine klinische Symptomatik mit wiederholtem Auftreten von Husten nach Trinken von Flüssigkeiten ist primär verdächtig auf rezidivierende Aspirationen. Die Differenzialdiagnostik umfasst neurologische Ursachen wie eine ALS mit bulbärer Symptomatik sowie Fistelbildungen zwischen dem Ösophagus und Tracheobronchialsystem. Diese sind häufig Folgen maligner Tumoren, insbesondere des Ösophagus, wobei die Diagnose und Symptomatik der Tumorerkrankung in der Regel schon längere Zeit vor dem Auftreten der Aspirationssymptome bekannt sind und oft im Vordergrund stehen.

Wiederholte Aspirationen ohne begleitende klinische Symptome einer neurologischen oder Tumorerkrankung müssen auch an das Vorliegen benigner aerodigestiver Fisteln denken lassen. Diese werden allerdings nur in seltensten Fällen beobachtet. So berichten Mangi et al. [1] über 13 Fälle in einem Zeitraum von 41 Jahren; in diesem Kollektiv war jedoch keine Fistel mit einer Broncholithiasis vergesellschaftet.

Klinische Symptome einer wiederkehrenden Aspiration erfordern neben der Bildgebung in Form eines Röntgen- bzw. CT-Thorax eine endoskopische Abklärung des Tracheobronchialsystems und eine (video-) endoskopische Untersuchung des Schluckaktes. Hierbei kann zwischen den verschiedenen Formen der klassischen Aspiration mit Übertritt von Farblösung in den Kehlkopf und die Trachea sowie dem Abhusten gefärbter Lösung ohne vorherige laryngeale Aspiration differenziert werden. Letztere ist wie im dargestellten Fall typisch für das Vorliegen einer tracheo- oder broncho-ösophagealen Fistel, ohne zunächst Aussagen über deren Genese zu erlauben. Der Verdacht auf eine aerodigestive Fistel erfordert eine sorgfältige endoskopische Untersuchung,

Abb. 3 Fistelöffnung (↑) im linken Hauptbronchus.

Abb. 4 a, b CT-Thorax 5/2009. Fistel zwischen Ösophagus und linkem Hauptbronchus (↓).

Abb. 5 a CT-Thorax 6/2008 und **b** CT-Thorax 5/2009. Im Verlauf nicht mehr vorhandenes Kalkfragment medial des linken Hauptbronchus (↓).

um auch kleinste Fistelöffnungen im Tracheobronchialsystem zu entdecken. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, auch Fistelöffnungen zu übersehen. Der vorliegende Fall unterstreicht deshalb in besonderem Maße, dass gegebenenfalls wiederholte endoskopische Untersuchungen einschließlich Ösophagoskopie und Bronchoskopie im Rahmen der Diagnostik erforderlich sind.

Der Nachweis kalzifizierter Strukturen im Bronchialsystem – sei es endoskopisch oder radiologisch – ist ein Indiz für eine zugrundeliegende Broncholithiasis, ohne jedoch weitere Rückschlüsse über die zugrundeliegende Ursache der Lithiasis zu erlauben. Die Broncholithiasis ist zunächst nur durch das Auftreten von kalzifiziertem Material innerhalb des Bronchiallumens gekennzeichnet und stellt einen extrem seltenen Befund dar. Olson et al. [2] berichten von 95 Fällen aus der Mayo Clinic in einem Zeitraum von 40 Jahren. Die Broncholithiasis ist im Wesentlichen assoziiert mit Infektionen wie einer Tuberkulose, Histoplasmose, Aktinomykose oder Nocardiose, aber auch bei Silikosen beobachtet worden [2–13]. Im aktuellen Fall ergaben sich keine eindeutigen Beweise für eine derartige Genese, wenngleich vom Alter und der Herkunft des Patienten postspezifische Verkalkungen am wahrscheinlichsten erscheinen.

Die polypoide Struktur, die bei der auswärtigen Bronchoskopie vor dem Abhusten der Broncholithen gesehen wurde, muss als granulomatöse Reaktion auf die Kalzifikationen und eine beginnende Wandlungstendenz gedeutet werden. Allerdings trat

eine weitere Wanderung der Kalzifikationen in dem Bereich, in dem die polypoiden Strukturen beobachtet wurden, nicht auf, sodass zu diskutieren ist, dass die überschießende granulomatöse Veränderung durchaus einen weiteren Wanderungsprozess verhindert hat. Inwieweit die initialen Symptome mit Husten vor dem Auftreten der Lithoptysis möglicherweise schon von einer kleinen Fistel zwischen dem linken Hauptbronchus und dem Ösophagus resultierten, bleibt spekulativ.

Das Auftreten einer aerodigestiven Fistel im Zusammenhang mit einer Broncholithiasis ist nur vereinzelt beobachtet worden. Cerfolio et al. [14] berichten von nur 2 Fisteln bei 50 Patienten mit Broncholithiasis. Eine retrospektive Analyse über 38 Jahre aus der Mayo Klinik [15] konnte 9 Patienten mit broncho-ösophagealer Fistel ausmachen: davon waren 7 Fisteln rechtsseitig lokalisiert, entsprechend der prädominierenden Lokalisation benigner broncho-ösophagealer Fisteln anderer Ursache [2, 16]. Insofern stellt die im dargestellten Fall beobachtete linksseitige Fistelöffnung eine ungewöhnliche Lokalisation dar.

Das Abhusten von „Steinen“, also kalkhaltigem Material, wird als „lithoptysis“ oder „phtisis calculosa“ [3, 17] bezeichnet und ist pathognomonisch für eine zugrundeliegende Broncholithiasis und Wanderung des Broncholithen. In der Literatur finden sich nur einzelne Fallberichte über benigne broncho-ösophageale Fisteln, die durch eine Broncholithiasis verursacht und durch eine Lithoptysis symptomatisch wurden [3, 17–19]. Wie im darge-

stellten Fall war die Lithoptysis immer mit einer Hämoptyse vergesellschaftet.

Der Nachweis einer broncho-ösophagealen Fistel im CT ist ungewöhnlich und kann primär nicht erwartet werden. Auch im dargestellten Fall konnte im ersten CT-Thorax keine Fistel entdeckt werden. Erst nach der Expektorierung von multiplen Fragmenten eines großen Broncholithen stellte sich im Kontroll-CT die linksseitige broncho-ösophageale Fistel bei gleichzeitigem Fehlen einer Kalzifikation eines mediastinalen Lymphknotens dar. Dies unterstreicht, dass auf Veränderungen im Erscheinungsbild und der Größe bekannter mediastinaler oder hilärer Kalzifikationen geachtet werden muss, da sie als Hinweis auf eine Broncholithiasis und ihre möglichen Komplikationen dienen können, insbesondere wenn typische klinische Symptome wie rezidivierender Husten, gegebenenfalls sogar mit Expektorierung von kalkhaltigem Material, koexistieren.

Zur Vermeidung weiterer Aspirationen ist ein definitiver Verschluss aerodigestiver Fisteln erforderlich. Therapie der Wahl ist deshalb die operative Resektion der Fistel über eine Thorakotomie mit Übernähung von Trachea, Bronchus und Ösophagus sowie gleichzeitiger plastischer Deckung mittels eines Muskelinterponats [1, 11, 16, 17]. In Einzelfällen mit Inoperabilität können endoskopische Verfahren mit Fistelverklebung allein oder mit zusätzlichem Clipping [20, 21] zum Einsatz kommen.

Zusammenfassend ist der dargestellte Fall bezüglich der Symptomatik rezidivierender Aspirationen sowie des klinischen Verlaufs einer Broncholithiasis mit Migration, Lithoptysis und Fistelausbildung exemplarisch.

Interessenkonflikt

Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

- 1 *Mangi AA, Gaissert HA, Wright CD et al.* Benign broncho-oesophageal fistula in the adult. *Ann Thorac Surg* 2002; 73: 911–915
- 2 *Olson EJ, Utz JP, Prakash UB.* Therapeutic bronchoscopy in broncholitis. *Am J Respir Crit Care Med* 1999; 160: 766–770
- 3 *Kidd HM, Christopherson E.* Broncholitis and broncho-oesophageal fistula. *Can Med Assoc J* 1951; 64: 142–146
- 4 *Seo JB, Song KS, Lee JS et al.* Broncholitis: review of the causes with radiologic-pathologic correlation. *Radiographics* 2002; 22: S199–213
- 5 *Antão VC, Pinheiro GA, Jansen JM.* Broncholitis and lithoptysis associated with silicosis. *Eur Respir J* 2002; 20: 1057–1059
- 6 *Hammoud ZT, Rose AS, Hage CA et al.* Surgical management of pulmonary and mediastinal sequelae of histoplasmosis: a challenging spectrum. *Ann Thorac Surg* 2009; 88: 399–403
- 7 *Hirschfield LS, Graver LM, Isenberg HD.* Broncholitis due to Histoplasma capsulatum subsequently infected by actinomycetes. *Chest* 1989; 96: 218–219
- 8 *Kim TS, Han J, Koh WJ et al.* Endobronchial actinomycosis associated with broncholitis: CT findings for nine patients. *AJR Am J Roentgenol* 2005; 185: 347–353
- 9 *Reddy AJ, Govert JA, Sporn TA et al.* Broncholith removal using cryotherapy during flexible bronchoscopy: a case report. *Chest* 2007; 132: 1661–1663
- 10 *Samson IM, Rossoff LJ.* Chronic lithoptysis with multiple bilateral broncholitis. *Chest* 1997; 112: 563–565
- 11 *Faber LP, Jensik RJ, Chawla SK et al.* The surgical implication of broncholitis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1975; 70: 779–789
- 12 *Weed LA, Andersen HA.* Etiology of broncholitis. *Dis Chest* 1960; 37: 270–277
- 13 *Tsubochi H, Endo S, Suhara K et al.* Endobronchial aspergillosis and actinomycosis associated with broncholitis. *Eur J Cardiothorac Surg* 2007; 31: 1144–1146
- 14 *Cerfolio RJ, Bryant AS, Maniscalco L.* Rigid bronchoscopy and surgical resection for broncholitis and calcified mediastinal lymph nodes. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2008; 136: 186–190
- 15 *Ford MA, Mueller PS, Morgenthaler TI.* Bronchoesophageal fistula due to broncholitis: a case series. *Respir Med* 2005; 99: 830–835
- 16 *Manac'h D, Riquet M, Plaza de los Reyes M et al.* Esophago-bronchial fistula in adults. *Ann Chir* 1990; 44: 636–641
- 17 *Carvajal Balaguera J, Mallagray Casas S, Martínez Cruz R et al.* Bronchoesophageal fistula and broncholitis. *Arch Bronconeumol* 1995; 32: 184–187
- 18 *Tinney WS, Moersch HJ.* Broncholitis. *Surg Clin North Am* 1944; 24: 830–838
- 19 *Shaaban AM, Mann H, Morrell G et al.* A case of broncholitis and esophagobronchial fistula. *J Thorac Imaging* 2007; 22: 259–262
- 20 *DeLuca G, Griffo S, Monaco M et al.* Combined endoscopic approach in the treatment of benign broncho-oesophageal fistula. *Thorax* 2008; 63: 1024–1025
- 21 *Yellapu RK, Gorthi JR, Kiranmayi Y et al.* Endoscopic occlusion of idiopathic benign esophago-bronchial fistula. *J Postgrad Med* 2010; 56: 284–286