Erratum

T. Schaberg et al. Empfehlungen zur Therapie, Chemoprävention und Chemoprophylaxe der Tuberkulose im Erwachsenen- und Kindesalter. Pneumologie 2012; 66, Online-Publikation: 10. 2. 2012**9.3.1 Erstrang-Medikamente**

Im ersten Absatz wurde der Satz „Streptomycin und Ethambutol können bei mäßiger Niereninsuffizienz in normaler Dosis zwei- bis dreimal pro Woche gegeben werden.“ wie folgt korrigiert: „Streptomycin und Ethambutol können bei Niereninsuffizienz in normaler Dosis zwei- bis dreimal pro Woche gegeben werden.“ (► Tab. 25).

Tabelle 10:

Fußnote 2: statt 15 mg/d muss es heißen **15 mg/kg KG/d**.

9.1.1 Besonderheiten der kindlichen Tuberkulose

Der Satz „Bei Kindern mit Kontakt zu einer Person mit ansteckungsfähiger Tuberkulose ...“ muss lauten: „Bei Kindern **unter 5 Jahren** mit Kontakt zu einer Person mit ansteckungsfähiger Tuberkulose ...“

12.11 Kontrolle nach der präventiven Chemotherapie

Die Literatur **[106, 174]** muss nach dem Satz „...entwickelnde Tuberkulose auszuschließen“ stehen statt nach dem Satz „...nach einem Jahr erneut zu kontrollieren“.

12.12 Chemoprophylaxe

Der Satz „Bei älteren Kindern und Erwachsenen ist eine prophylaktische Chemotherapie im Regelfall nicht erforderlich; diese kann jedoch altersunabhängig auch bei exponierten Kontaktpersonen indiziert sein, die eine angeborene, erworbene oder medikamentös induzierte Immunschwäche haben [174].“ wird gestrichen.

Der Satz lautet jetzt: „Bei älteren Kindern und Erwachsenen ist eine prophylaktische Chemotherapie **altersunabhängig insbesondere dann zu erwägen, wenn sie** eine angeborene, erworbene oder medikamentös induzierte Immunschwäche haben [174].“