Humanes Mikrobiom – Wie Mensch und Mikrobe zusammenwirken

Die neuere **FORSCHUNG** zeigt, welche Bedeutung Keime für uns haben.

Jürgen Schulze

DIE PHYLOGENETISCHE und ontogenetische Entwicklung aller mehrzelligen Organismen findet unabdingbar in Koevolution mit Mikroorganismen statt. Im Laufe der Evolution hat der Mensch mit Mikroben auf seinen äußeren und inneren Oberflächen koexistierende Lebensgemeinschaften gebildet. Die Gesamtheit der dort nachweisbaren Mikroorganismen stellt die Mikrobiota des Menschen (synonym für Körperflora) dar. Man findet sie

- auf den äußeren Oberflächen: Haut, Haaren, Nägeln
- auf den Kontaktzonen: Konjunktiva, äußeres Ohr, Urethra, äußerer Bereich der Vagina, Zervix
- im Respirationstrakt: Nase, Mund, Rachen
- im Verdauungstrakt: Magen, Dünndarm, Dickdarm

An jedem Standort bilden sich eigenständige Lebensgemeinschaften zwischen Mensch und Mikroben heraus (Mikrobiözenosen). Besonders intensiv werden das Vorkommen und die Wirkungsweise von Mikroorganismen im Verdauungstrakt untersucht. Die Summe der im Magen-Darm-Trakt nachweisbaren lebenden Mikroorganismen (ca. 10^{14} KBE = Koloniebildende Einheiten) wird als Mikrobiota des Gastrointestinaltrakts (synonym für Darmflora) bezeichnet.

Quantensprünge in der mikrobiellen Analytik

Bis in die 1980er-Jahre identifizierten Fachleute und Speziallabors die Mikroor-

ganismen sowohl qualitativ als auch quantitativ ausschließlich mittels kultureller, biochemischer, physikochemischer und mikroskopischer (inkl. elektronenmikroskopischer) Techniken. Die Entwicklung molekularbiologischer Analyseverfahren, v. a. die Einführung der DNA-Sequenzierung, hat die humanmedizinische mikrobiologische Forschung revolutioniert. Mit den sehr zeitaufwändigen traditionellen Methoden war es über viele Jahrzehnte gelungen, durch Kultivierung auf geeigneten Nährböden etwa 450 verschiedene Arten von im Magen-Darm-Trakt lebenden Mikroorganismen zu identifizieren. Heute sind bereits mehr als 1000 Mikroorganismen bekannt (s. u.), die sich anhand ihrer genetischen Determinanten als eigenständige Arten der Magen-Darm-Mikrobiota des Menschen differenzieren lassen. Hochrechnungen zufolge vermuten Experten bis zu etwa 10 000 Mikroorganismen-Arten in unserer Mund-Magen-Darm-Mikrobiota. Obwohl ca. 80 % davon unbekannte und nicht

kultivierbare Bakterien sein dürften, ist es durch Abgleich von Sequenzähnlichkeiten mit bekannten Genen möglich, Informationen über Enzyme, Stoffwechselleistungen und ihre Bedeutung innerhalb des mikrobiologischen Systems zu erhalten. Immer ausgeklügeltere Sequenzierungsmethoden, gepaart mit einer Hochleistungs-Rechentechnik, die den Zeitbedarf für die Identifikation des genetischen Materials extrem verkürzt, lassen die Forschung dazu boomen.

Das Mikrobiom und sein Metagenom

Nachdem im Jahr 2001 das humane Genom (Gesamtheit aller Gene der körpereigenen Zellen) mit etwa 22 000 Genen entschlüsselt worden war, wurden 2007/2008 etwa zeitgleich in den USA das Human Mikrobiom Project (HMP) und in Europa das Konsortium für Metagenomics of the Human intestinal tract (MetaHit) initiiert. Es

KURZ GEFASST

- 1** Keime galten lange einzig als potenzielle Krankheitserreger, die es zu vernichten galt. Dabei sind manche, im Darm und auf anderen Körperoberflächen angesiedelte, wichtig für die Gesundheit.
- 2** Der Mensch lebt in einer Lebensgemeinschaft mit 100 Billionen Bakterien. Diese bringen 150-mal mehr Gene mit, als der Mensch in seinen eigenen Körperzellen hat.
- 3** Die Mikrobiota trägt zur Steuerung physiologischer Vorgänge und Aufrechterhaltung der Gesundheit bei. Sie agiert als Superorgan in Kooperation mit dem Makroorganismus.

Abb. 1 Das gastrointestinale Mikrobiom mit seiner Vielzahl an Mikroorganismen greift auf unterschiedlichsten Ebenen in unseren Stoffwechsel ein. Es unterhält nicht nur Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sondern ist, wie aktuelle Forschungen beweisen, auch an der Entstehung zahlreicher intestinaler, metabolischer und psychischer Erkrankungen beteiligt. Foto: © Fotolia/T. L. Furrer

war der US-amerikanische Nobelpreisträger und Molekularbiologe Joshua Lederberg, der bereits 2001 forderte, das Genom des Menschen nicht losgelöst von den Genen seiner Mikrobiota zu betrachten.

Mikroorganismen und ihre Gene

Lederberg prägte den Begriff „Mikrobiom“ für den „anderen Teil des Menschen“, nämlich für „seine“ Mikroorganismen mit ihren genetischen Ausstattungen und ihren Beziehungen (z. B. Stoffwechsel, Immunmodulation etc.) zum jeweiligen Standort in unserem Körper. Damit führte er die ganzheitliche Betrachtungsweise, die seit langem Kernstück der naturheilkundlichen Forschung und Praxis ist, auch in die schulmedizinischen Fachgebiete mit mikroökologischem Hintergrund ein. Die erste Komplettanalyse des kollektiven Genoms aller Mikroorganismen auf und in unserem Körper, des Metagenoms, ergab 3 300 000 Gene [11]. Nach neueren Angaben, bei denen neben Bakterien und Pilzen auch Viren einbezogen sind, sollen es

ca. 8 000 000 Gene sein, d. h. auf 1 humanes Gen kommen mindestens 150, möglicherweise sogar 360 mikrobielle Gene. Diese enorm hohe Gen-Dichte im Mikrobiom ermöglicht in erheblichem Maße den Austausch von Gen-Substanz, mithin auch den Austausch funktioneller Eigenschaften [13].

Mikrobiom als Multitalent und Superorgan

Das humane Mikrobiom trägt im großen Umfang zur Steuerung physiologischer Vorgänge und Aufrechterhaltung der Gesundheit bei. Es sorgt für den Aufbau, die Stabilität und partiell für die Reparatur einer unspezifischen Barriere zur Abwehr

INFORMATION

Was ist was?

- **Mikrobiota:** Gesamtheit aller Mikroorganismen eines definierten Standorts
- **Metagenom:** Gesamtheit der Gene und Genome aller Mikroorganismen eines definierten Standorts
- **Mikroökologie:** Teilgebiet der Biologie, das sich mit den Beziehungen zwischen und innerhalb der Mikroorganismen (Lebensgemeinschaften) und der sie umgebenden Außenwelt (Helmuth Haanel, 1960) befasst
- **Biom:** Lebensgemeinschaft (Biozönose) in einem definierten Lebensraum mit seinen belebten und unbelebten Faktoren
- **Mikrobiom:** funktionelle Einheit aller Mikroorganismen, inkl. des zugehörigen Metagenoms sowie der Wechselbeziehungen zwischen Mikroorganismen, Metagenom und dem vorherrschenden Milieu innerhalb eines definierten Standorts (bisher gibt es keinen Konsens für eine allgemeingültige Definition)

von Infektionskeimen. Gleichzeitig nimmt es Einfluss auf die Entwicklung und Aktivität des darmassoziierten Immunsystems. Mit unüberschaubaren metabolischen Aktivitäten (etwa 30 % der Metaboliten im Blut sind mikrobiellen Ursprungs) ist die Mikrobiota in den humanen Metabolismus integriert. Beispielhaft sei erwähnt, dass sich das Mikrobiom am Abbau komplexer Polymere aus der Nahrung beteiligt und dem Wirt zusätzlich Energie, aber auch Vitamine (B₁₂, Folsäure, Biotin, Vitamin K₂) zur Verfügung stellt. Mikrobiell gebildete kurzkettige Karbonsäuren fördern die Durchblutung der Darmschleimhaut (Acetat), haben einen positiven Effekt auf den Cholesterolfstoffwechsel der Leber (Propionat), stabilisieren die Funktion der Kolonozyten bei gleichzeitiger Verminderung der Entzündungsaktivität (Butyrat) und reduzieren über die pH-Neutralisation im Dickdarm die Ammoniak-Last (Laktat). Katalasen von Laktobazillen wirken über die Reduktion oxidativer Radikale detoxifizierend und ermöglichen die Entgiftung von toxischen oder (pro)kanzerogenen Stoffen exogenen oder endogenen Ursprungs bereits im Darm, dessen Milieu im Wesentlichen von der Funktion des Mikrobioms bestimmt wird [14].

Ein neues Zuhause im Baum des Lebens

Das wachsende Bedürfnis, Verwandtschaftsgrade zwischen einzelnen Arten nicht nur an phänotypischen, also vom Erscheinungsbild geprägten, sondern auch an genotypischen Merkmalen aufzustellen, hat in den letzten 50 Jahren zur Revision der Systematik geführt. Auf Basis von rRNA-Genen ließ sich der gesamte „phylogenetische Baum des Lebens“ auf 3 Domänen reduzieren, nämlich die Archaeen (früher Urbakterien), Bakterien (beides sind Prokaryonten) und Eukaryonten (alle Lebewesen mit einem Zellkern). Vor allem die Möglichkeit der Gensequenzierung hat die Grundlage für neu entdeckte genetisch determinierte Verwandtschaften und somit für ein völlig neues Arrangement des taxonomischen Systems der Mikroorganismen geliefert.

Die Domäne der Bakterien umfasst zurzeit 29 Phyla (Stämme; die verschiede-

nen Bakteriengattungen, aus denen sich nach heutigem Verständnis die Mikrobiota des Gastrointestinaltrakts rekrutiert, finden sich in Tab. 1).

Im Wesentlichen sind es nur 4 Phyla (Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria), zu denen Hunderte von Bakterienarten gehören und die mit > 95 % aller mikrobiellen Zellen das Gros der Darm-Mikrobiota bilden. Den restlichen Anteil (< 5 %) stellen Mikroorganismen-Arten, die aus den Phyla Fusobacteria, Verrucomicrobia, Euryarcheota und Ascomycota stammen [4].

Bei Analysen zur kompletten fäkalen Mikrobiota, die mittels DNA-Sequenzierung in Proben von 124 Europäern durchgeführt wurden, fanden sich ca. 1000–1150 unterschiedliche, kultivierbare und nicht kultivierbare Bakterienarten [11]. Mindestens 160 der identifizierten Arten wurden bei jedem Probanden gefunden. Trotz individueller Unterschiede in der Artenvielfalt scheint jede individuelle Mikrobiota mit einem „Kern-Mikrobiom“ ausgestattet zu sein, das Störungen des Systems besser übersteht.

Stamm oder keiner?

Bei Bakterien und Archaeen ist der Begriff „Phylum“ (deutsch: Stamm) eine hierarchische Rangstufe unterhalb der Domäne. Keine taxonomische Rangstufe, sondern eine Bezeichnung für eine Abstammungslinie (Klon) ist die in der Praxis häufig verwendete Bezeichnung „Bakterienstamm“ (engl.: bacterial strain) innerhalb einer Art. So wird z. B. mit der Bezeichnung *E. coli* Stamm Nissle 1917 eine Abgrenzung zu anderen Vertretern derselben Art *E. coli* festgelegt.

Das Essen definiert unsere Mikrobiota

Ein weiteres überraschendes Ergebnis war, dass die Zusammensetzung der Mikrobengemeinschaft im Darm bestimmten Ernährungsprinzipien zu unterliegen scheint. Demnach ist die Darm-Mikrobiota (fast) jedes Menschen 3 Clustern mit typischer Bakteriengruppen-Dominanz, den sog. „Enterotypen“, zuzuordnen. Diese wurden nach der jeweils dominierenden Gattung benannt (s. Kasten). Die Zuordnung zu ei-

INFORMATION

Dominierende Mikrobengemeinschaften des Darmes

Enterotyp 1 – Bacteroides-Dominanz

- Besonderheit: ist spezialisiert auf den Abbau komplexer Kohlenhydrate und (tierischem) Eiweiß durch Fermentation sowie auf die Synthese von Biotin (Vitamin B₇), Vitamin B₂, Panthothensäure (Vitamin B₃) und Ascorbinsäure (Vitamin C)
- Bezug zur Ernährung: positive Korrelation zum Fleischverzehr

Enterotyp 2 – Prevotella-Dominanz

- Besonderheit: ist spezialisiert auf den Abbau von Zucker-Protein-Komplexen aus Muzinen, Synthese von Folsäure und Vitamin B₁
- Bezug zur Ernährung: positive Korrelation zum Vegetarismus

Enterotyp 3 – Ruminococcus-Dominanz

- Besonderheit: ist spezialisiert auf den Abbau von Zellulose, Muzinen und desaminierten Kohlenstoffgerüsten (Zucker), Alkoholen (unter allen untersuchten Proben die am häufigsten gefundene Konstellation)
- Bezug zur Ernährung: keine klare Korrelation zu einer Ernährungsform, evtl. Mischkost

nem der 3 Enterotypen scheint unabhängig von Nationalität, Alter, Geschlecht und Body-Mass-Index zu sein. Allerdings besteht eine enge Assoziation zum Langzeit-Ernährungsverhalten [1], was den seit Langem vermuteten, aber schwer nachweisbaren Einfluss der Ernährung auf die Darm-Mikrobiota nahelegt.

Die Annahme, dass der Einfluss auf die Mikrobiota nur über ein Langzeitdiätregime funktioniert, ist durch aktuelle Untersuchungsergebnisse infrage gestellt [5]. In einem Pilotprojekt wurde 10 Mischköstlern (21–33 Jahre alt) entweder eine Diät tierischer Herkunft (Fleisch, Eier, Käse) oder eine vegetarische Diät (Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Früchte) verabfolgt. Unter der tierischen Kost wurde bereits nach einem Tag die Anzahl der vorherrschenden galletoleranten Mikroorganismen *Alistipe*, *Bifidobacteria* und *Bacteroides*

TABELLE 1

Auswahl der für die Mikrobiota des Gastrointestinaltrakts relevanten Gattungen und die robuste taxonomische Zuordnung zum „phylogenetischen Baum des Lebens“ [modifiziert nach 4]

Domäne	Phylum	Ordnung	Gattung
Archaeen	Euryarchaeota	Methanobacteriales	Methanobrevibacter
Bakterien	Actinobacteria	Bifidobacteriales	Bifidobacterium
		Coriobacteriales	Coriobacterium + weitere 5 Gattungen
	Bacteroidetes	Bacteroidales	Bacteroides Prevotella + weitere 2 Gattungen
	Firmicutes	Bacillales	Staphylococcus
		Clostridiales	Blautia Butyrivibrio Clostridium Coprococcus Eubacterium Faecalibacterium Roseburia Ruminococcus + weitere 6 Gattungen
		Erysipelotrichales	Coprobacillus Holdemania Catenibacterium
		Lactobacillales	Enterococcus Lactobacillus Lactococcus Streptococcus
		Selenomonadales	Veillonella + weitere 28 Gattungen
	Fusobacteria	Fusobacteriales	Fusobacterium
	Proteobacteria	Enterobacteriales	Escherichia Enterobacter
	Verrucomicrobia	Verrucrobiales	Akkermansia
Eukaryonten	Ascomycota	Saccharomycetales	Candida

weiter erhöht und der Gehalt an Firmicuten (Roseburia, Eubacterium und Ruminococcus), die v. a. pflanzliche Polysaccharide degradieren, vermindert. Unter dem Einfluss der Ernährung änderte sich nicht nur die qualitative und quantitative Zu-

sammensetzung der Mikrobiota, sondern auch das Mikrobiom mit dem Bezug zu möglichen gesundheitlichen Konsequenzen. Das fäkale Gallensäureprofil zeigte eine Erhöhung der Desoxycholsäurekonzentration, die mit der Entstehung von Le-

berkrebs und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) assoziiert ist. Zudem wird auch das vermehrte Auftreten des gallensäuretoleranten Bakteriums Bilophila wadsworthia als Risikomerkmal für CED angesehen.

Die individuelle Adaptation an bestimmte Ernährungsregime kann ebenfalls über Änderungen im Mikrobiom gesteuert werden, wie das folgende Beispiel zeigt: Spezielle Kohlenhydrate in Speisealgen („Nori“) können weder von körpereigenen noch von den üblicherweise im menschlichen Darm vorkommenden bakteriellen Enzymen aufgespalten werden. Im intestinalen Mikrobiom von Japanern, die häufig fermentierte Algen verzehren, jedoch nicht bei Europäern ist kürzlich ein Gen identifiziert worden, das die Biosynthese von Enzymen zur Verdauung jener Kohlenhydrate kodiert. Dieses „Nori-Gen“ entstammt dem Genom mariner Bakterien und ist in das Genom von Darmbakterien der o. g. asiatischen Bevölkerungsgruppe transferiert worden [7].

Wie kommt der Mensch zu seiner Mikrobiota?

Bis vor kurzem bestand die einhellige Lehrmeinung, dass sich der Fetus im Uterus bis zur Geburt steril entwickelt und die mikrobielle Besiedelung erst während des Geburtsvorgangs beginnt. Neue wissenschaftliche Daten von zunächst tierexperimentellen und später auch humanen Untersuchungen legen nahe, dass der Fetus bereits vor der Geburt Kontakt mit Bakterien der mütterlichen Darm-Mikrobiota hat. Zunächst zeigten tierexperimentelle Untersuchungen, dass genetisch markierte Darmbakterien, die trächtigen Mäusen oral verabfolgt wurden, sich nach einem Tag bereits im Mekonium der Feten wiederfanden. Untersuchungen an Schwangeren und nachfolgend an ihren Neugeborenen ergaben, dass der mütterliche Lebensstil und die mütterliche Ernährung während der Schwangerschaft die initiale Grundausrüstung der Darm-Mikrobiota ihrer Kinder bestimmen. Das Mekonium aller untersuchten Kinder (N = 20) war zur Geburt bereits besiedelt: das einer Hälfte der Kinder mit dominierenden Milchsäurebakterien, das der anderen mit vorherrschenden Enterobakterien [6]. Bei Neugeborenen, die ge-

TABELLE 2

Ursachen für strukturelle und metabolische Veränderungen im intestinalen Mikrobiom [modifiziert nach 14]

Ursachen		Beispiele
Umwelt-Noxen	biologische	Infektionen Toxine Allergene
	chemische	Schwermetalle Herbizide Fungizide Insektizide Desinfektionsmittel
	physikalische	energiereiche Strahlung
Therapeutische Maßnahmen	Medikamente Strahlen	Antibiotikatherapie Chemotherapie weitere Medikamente Strahlentherapie Röntgenstrahlen
	chirurgische Eingriffe	Teilresektionen blinde Schlingen
Erkrankungen	strukturelle	Divertikel Stenosen Karzinome
	systemische	metabolische, z. B. Diabetes Immundefekte
	psychosoziale	psychische Belastungen emotionale Stressoren
Nahrung und Ernährung	Ernährungsverhalten	Fehlernährung (zu fett, zu eiweißreich) extremes Fasten totale parenterale Ernährung (TEP)
	Lebensmittelzusatzstoffe	Farbstoffe Geschmackstoffe Süßstoffe Konservierungsstoffe

Entwicklung der Darm-Mikrobiota

- Der erste Kontakt mit Kompartimenten des mütterlichen Mikrobioms findet in utero statt.
- Der Siedlungsprozess setzt sich unter der Geburt fort.
- In der Folge bilden sich standortspezifische Partnerschaften (Mikrobiozöosen) zwischen Makro- und Mikroorganismen heraus.
- Speziespezifische Gesetzmäßigkeiten und umweltspezifische Zufälligkeiten (z. B. Herkunft der Mikroorganismen, Ernährung, Medikamente, Fremdstoffe) bestimmen die mikrobiologischen Beziehungen und den Charakter des Mikrobioms.

stilt werden, rekrutiert sich die Mikrobiota über einen zusätzlichen Weg aus dem Bakterienpool der Mutter. Via Muttermilch erfolgt der Transfer v. a. obligat anaerob lebender Darmbakterien (z. B. Bifidobakterien) auf den Säugling, was in den letzten Jahren sowohl über Gen-Sequenzierung als auch kulturell mehrfach nachgewiesen worden ist. Zwar ist der diskutierte Darm-Brustdrüsen-Weg noch hypothetisch [10], aber mit mehr als 600 nachgewiesenen Bakterienarten enthält die Muttermilch viel mehr Mikroorganismen als erwartet [8]. Die Umstellung vom fakultativen zum strikt anaeroben Mikrobiom erfolgt demnach viel früher als ursprünglich angenommen [9]. Muttermilch liefert außerdem verschiedene Galakto-Oligosaccharide und Aminosäuren, die als „Bakterienfutter“ (Präbiotika) für das Keimzahlwachstum und den Stoffwechsel v. a. von Bifidobakterien wertvoll sind. Bereits zu Beginn des Lebens übernimmt die Ernährung eine prägende Rolle bei der Genese des individuellen intestinalen Mikrobioms. Säuglinge, die anstelle der Muttermilch eine Formelmilch erhalten, entwickeln in den ersten Wochen und Monaten ihres Lebens eher eine fäulnisbetonte Darm-Mikrobiota als die säurebetonte Bifidobakterien-Mikrobiota. Die wünschenswerte Artenvielfalt der Muttermilch ist jedoch eingeschränkt, wenn die Mütter übergewichtig sind, mit Kaiserschnitt entbunden haben und/oder mit Antibiotika behandelt wurden.

Was schadet der Mikrobiota – und uns?

Die ersten fundierten Erkenntnisse zur Bedeutung der intestinalen Mikrobiota für die Erhaltung der Gesundheit oder

Entstehung von Krankheiten stammen aus Untersuchungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts und sind mit Namen hervorragender Forscherpersönlichkeiten wie Louis Pasteur, Theodor Escherich, Ilja Metschnikoff, Robert Koch u. a. verbunden. Als Ursachen für Störungen der Mikroflora des Magen-Darm-Trakts wurden seinerzeit ausschließlich Infektionen mit pathogenen Mikroorganismen (zunächst nur Bakterien, später auch Pilze und Viren) dingfest gemacht. Der Freiburger Arzt und Hygieniker Alfred Nissle beschrieb erstmalig 1916 den „Coli-Antagonismus“ und stellte „die Grundlage einer neuen ursächlichen Bekämpfung der pathologischen Darmflora“ mit Mikroorganismen vor.

Antibiotika und weitere Arzneimittel

Die meisten Nebenwirkungen von Antibiotikatherapien äußern sich als gastroenterologische Beschwerden (am häufigsten Antibiotikaassoziierte Diarrhö), weil nicht nur Pathogene eliminiert sondern auch physiologische Mikroorganismen der Darm-Mikrobiota geschädigt werden. Weltweit sind ca. 8 000 antibiotisch wirksame Substanzen im Einsatz, die Jahresproduktion beläuft sich auf ca. 100 000 Tonnen. Antibiotika sind für das gastrointestinale Mikrobiom „Feind Nr. 1“. Weitere Arzneimittel, wie Medikamente zur Behandlung von Krebs, Schmerzmittel, Abführmittel oder Kortison, schädigen die Mikrobiota in unterschiedlichem Maße, ebenso wie Strahlen, Umweltgifte und Lebensmittelzusatzstoffe.

Erkrankungen

Ebenso nehmen diverse Erkrankungen Einfluss auf verschiedene Funktionen des Mikrobioms (s. Tab. 2).

Einfalt oder Vielfalt?

In der Vergangenheit wurde bei der Suche nach krankheitsbedingten Veränderungen in der Mikrobiota das Hauptaugenmerk auf einzelne Mikroorganismen (Pathogene oder sog. Leitkeime) gelegt, die am Krankheitsgeschehen ursächlich oder begleitend beteiligt sind. Alle für dieses Ziel optimierten mikrobiologisch-kulturellen Methoden erfüllen auch heute noch ihren Zweck. Allerdings ist den monolytischen Verfahren mit den neuen hochparallelen Sequenzierungstechniken und 16s-rDNA-basierten Identifikationsverfahren eine Untersuchungsmaschinerie zur Seite gestellt worden, die in kürzester Zeit nach Probenahme eine Flut von zusätzlichen Informationen erzeugt. Diese geben Auskunft über die funktionelle Kapazität aller beteiligten Mikroorganismen und vermitteln anhand der Identifikation enormer Mengen bakterieller Signaturen einen Eindruck über die Vielfalt („diversity“) der Mikrobiota.

Zusammengefasst ergibt sich, dass eine große Vielfalt an Mikroorganismen den besten Schutz vor Störfaktoren bietet und ein „gesundes“ Mikrobiom charakterisiert. Umgekehrt korreliert eine Verarmung der mikrobiellen Vielfalt des Mikrobioms mit Krankheit.

***Merke:** Auch mit zunehmendem Lebensalter nimmt der Artenreichtum im Mikrobiom ab.*

Neues Krankheitsverständnis, neue Behandlungsoptionen

Es ist bekannt, dass Störungen im Gleichgewicht der gastrointestinalen Mikrobiota sowohl zu Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt als auch zu extraintestinalen Erkrankungen führen können.

Gastrointestinale Erkrankungen

Enge Korrelationen zu einem gestörten Mikrobiom bestehen bei der Antibiotikaassoziierten Diarrhö, bei infektiösen Durchfällen und Darmmykosen, beim bakteriellen Überwucherungssyndrom des Dünndarms (SIBO), bei chronischen Darmerkrankungen (CED: Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, mikroskopische Kolitis), bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten und beim postinfektiösen Reizdarmsyndrom (PI-RDS).

Schwache Korrelationen bestehen zur chronischen Obstipation, weiteren RDS-Entitäten und zum kolorektalen Karzinom.

Extraintestinale Erkrankungen

Ein gestörtes intestinales Mikrobiom findet sich aber auch bei zahlreichen extraintestinalen Erkrankungen: bei rekurrenden Harnwegsinfektionen, rezidivierenden Vulvovaginalmykosen, enterogenen Arthritiden, reaktiven Arthritiden und Spondylarthritiden; ferner bei chronischen und allergischen Erkrankungen der Haut und Atemwege (Neurodermitis, Psoriasis, Urtikaria, Asthma) und bei der hepatischen Enzephalopathie.

Neue Einsichten in die Zusammenhänge zwischen Mikrobiom und Krankheiten hat das umfangreiche Datenmaterial über die Vielfaltigkeit der Mikrobiota inkl. des möglichen Genaustauschs geliefert. So ist sicher, dass durch Stress verursachte Erkrankungen, Angst und Depressionen, Multiple Sklerose und Autismus über das Mikrobiom getriggert werden.

Behandlungsoptionen

Die funktionelle Kapazität des gesamten Mikrobioms eröffnet neue Wege zur Therapie z. B. des metabolischen Syndroms (Adipositas, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, Atherosklerose). Die meisten optimistischen Ergebnisse zu diesen Beziehungen stammen zwar aus Tierversuchen. Nach und nach werden sie jedoch für den Menschen verifiziert. So ist bei Adipösen der relative Gehalt an Mikroorganismen des Phylums Bacteroidetes niedriger und der des Phylums Firmicutes höher als bei Normalgewichtigen. Im Mikrobiom Normalgewichtiger, die eine hochkalorische Diät erhielten, änderte sich rasch das Verhältnis dieser beiden Phyla zueinander: Der Anteil der Firmicutes stieg, der der Bacteroidetes sank um 20 %. Gegenläufig veränderte sich das Verhältnis beider Phyla bei Adipösen, die sich über ein Jahr mit einer energiereduzierten Diät ernährten. Die Transplantation einer Mikrobiota von morbid adipösen Patienten in normalgewichtige Mäuse löste bei diesen Adipositas aus [12]. Im Mikrobiom Adipöser finden sich höhere Aktivitäten von Glycosidhydrolasen und Pyruvat-Formiat-Lyase, was auf eine erhöhte Spaltungs- und Verwertungsaktivität von Bal-

laststoffen hinweist. Adipöse erhalten also mehr Energie aus angeblich nicht verwertbaren Ballaststoffen als Normalgewichtige [15].

Therapie mit Bakterien

Das Prinzip, eine gestörte Darm-Mikrobiota durch die Zufuhr lebender physiologischer Mikroorganismen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, hat bereits eine über 100-jährige Geschichte. Mutaflor® ist das älteste als Arzneimittel zugelassene Bakterienpräparat mit dem probiotischen E.-coli-Stamm Nissle 1917. Die Fortschritte der Antibiotika-Forschung in der 2. Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ließen allerdings den therapeutischen Einsatz von Mikroorganismen in den Hintergrund geraten. Erst das vermehrte Auftreten gegen Antibiotika resistenter Infektionskeime hat in den 1990er-Jahren zu einer Wiederbelebung der probiotischen Therapie geführt [14]. Jährlich erscheinen weit über 1000 internationale Fachpublikationen zu Wirkmechanismen und zur Wirksamkeit von Probiotika. Der Aufschwung, den die frühere Darmflora-Forschung durch die neuen Möglichkeiten der Mikrobiom-Forschung erhält, ist natürlich gekoppelt mit dem Wunsch nach effizienten, möglichst personalisierten therapeutischen Strategien.

Ausgerechnet eine antiquierte Methode, die aufgeführt ist im Handbuch für medizinische Notfälle des chinesischen Arztes Ge Hong, der in der Dongjin-Dynastie des 4. Jahrhunderts lebte, und längst totgesagt ist – nämlich die Transplantation von Fäkalkeimen – genießt eine Renaissance [2]. Die Clostridium-difficile-Diarrhö, die häufigste Form der nosokomialen infektiösen Enteritis, wird standardmäßig mit den Antibiotika Vancomycin und Metronidazol therapiert. Rund ein Viertel der Patienten erleidet jedoch ein Rezidiv, was für ältere und multimorbide Patienten lebensgefährlich sein kann. Im Verlauf der letzten 50 Jahre sind mehrere Fallbeispiele mit erfolgreicher Therapie durch Stuhlübertragung berichtet worden. In einer kürzlich publizierten offenen, randomisierten und kontrollierten Studie lag die Heilungsrate nach Stuhltransplantation bei 93 % (15/16), bei 2 Kontrollgruppen nach Vancomycinthherapie bei 31 % (4/13), bzw. 23 % (3/13) [16]. Zurzeit wird weltweit versucht, die Me-

thode zu standardisieren, um sie auch für weitere Indikationen einsetzen zu können. Ein standardisiertes, möglicherweise personalisiertes Mikrobengemisch mit hoher Diversität könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. ■

Dieser Artikel ist online zu finden:

<http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1396949>

Literatur

- [1] Arumugam M, Raes J, Pelletier E, Le Paslier D, Yamada T, Mende DR et al. Enterotypes of the human gut microbiome. *Nature* 2011; 473: 174–180
- [2] Baumgart DC. Bedeutung des Mikrobioms heute. *Current Congress – Viszeralmedizin* 2014; 20–21. Letzter Aufruf 04.11.2014 https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw-current-congress/Cc_DGVS_2014_Leipzig.pdf
- [3] Bianconi E, Piovesan A, Facchin F, Beraudi A, Casadei R, Frabetti F et al. An estimation of the number of cells in the human body. *Ann Hum Biol* 2013; 40: 463–471
- [4] Blaut M. Ecology and Physiology of the intestinal tract. *Curr Topics Microbiol Immunol* 2013; 358: 247–272
- [5] David LA, Maurice CF, Carmodi RN, Gootenberg DB, Button JE, Wolfe BE et al. Diet rapidly and reproducibly alters human gut microbiome. *Nature* 2014; 505: 559–563
- [6] Gosalbes MJ, Llop S, Valles Y, Moya A, Ballester F, Francino MP. Meconium microbiota types dominated by lactic acid or enteric bacteria are differentially associated with maternal eczema and respiratory problems in infants. *Clinical & Experimental Allergy* 2013; 43: 198–211
- [7] Hehemann JH, Correc G, Barbeyron T, Helbert W, Czjzek M, Michel G. Transfer of carbohydrate-active enzymes from marine bacteria to Japanese gut microbiota. *Nature* 2010; 464: 908–912
- [8] Hunt KM, Foster JA, Forney LJ, Schütte UME, Beck DL, Abdo Z, Fox LK et al. Characterization of the Diversity and Temporal Stability of Bacterial Communities in Human Milk. *PLoS One* 2011; 6: e21313. doi:10.1371
- [9] Jost T, Lacroix C, Braegger CP, Chassard C. New insights in gut microbiota establishment in healthy breast fed neonates. *PLoS One* 2012; 7: e44595
- [10] Jost T, Lacroix C, Braegger CP, Rochat F, Chassard C. Vertical mother-neonate transfer of maternal gut bacteria via breastfeeding. *Environ Microbiol.* 2014; 16: 2891–2904
- [11] Qin J, Li R, Raes J, Arumugam M, Burgdorf KS, Manichanh C, Nielsen T et al. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing. *Nature* 2010; 464: 59–65
- [12] Ridaura VK, Faith JJ, Rey FE, Cheng J, Duncan AE, Kau AL et al. Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice. *Science* 2013; 341: 1241214
- [13] Schreiber S, Nikolaus S, Rosenstiel P. Mikrobiom und Ernährung – Therapie der Zukunft für chronisch entzündliche Darmerkrankungen? *Internist* 2014; 55: 889–897
- [14] Schulze J, Sonnenborn U, Ölschläger T, Kruis W. Probiotika – Mikroökologie, Mikrobiologie, Qualität, Sicherheit und gesundheitliche Effekte. Stuttgart: Hippokrates; 2008
- [15] Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunenko et al. A core gut microbiome in obese and lean twins. *Nature* 2009; 457: 480–484
- [16] Van Nood E, Vrieze A, Nieuwdorp M, Fuentes S, Zoetendal E et al. Duodenal infusion of donor feces for recurrent *Clostridium difficile*. *N Engl J Med* 2013; 368: 407–415

PD Dr. rer. nat. habil. Jürgen Schulze

Alice-Bloch-Str. 7

14558 Nuthetal

E-Mail: JuR.Schulze@t-online.de

Jürgen Schulze ist Diplom-Biologe und habilitierter Humanphysiologe mit folgenden Arbeitsbereichen: 25 Jahre leitende Forschungstätigkeit am Ernährungsinstitut in Potsdam-Rehbrücke (heute: Nuthetal) mit den Schwerpunkten gastrointestinale Mikrobiota und Mikroökologie, Säuglingsernährung, Ballaststoffe. Er war zudem 14 Jahre Bereichsleiter in der Pharmaindustrie (präklinische und klinische gastroenterologische Forschung), hatte einen Lehrauftrag für Pharmazeutische Mikrobiologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn inne und ist Mitautor von Fachbüchern und über 130 wissenschaftlichen Publikationen u. a. zur Wirkweise und Wirksamkeit von Probiotika.