Punção líquórica cervical lateral em C1-C2: um procedimento de grande utilidade em pacientes vítimas de trauma – Relato de série de casos

Lateral Cervical Spinal Puncture at c1-c2: A Useful Procedure in Trauma Patients – Report of a Series of Cases

Rodrigo Moreira Faleiro¹ Sérgio Augusto Vieira Cançado² Luiz Alberto Otoni Garcia²
Paula de Castro Menezes Cândido³ Luanna Rocha Vieira Martins⁴

¹ Chefe do serviço de Neurocirurgia e Neurologia do Hospital João XXIII; Neurocirurgião do Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil

² Residente de Neurocirurgia da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), Belo Horizonte, MG, Brasil

³ Residente de Radiologia do Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil

⁴ Acadêmica de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Address for correspondence Rodrigo Moreira Faleiro, MSc, Rua Caraça, 518/201, Serra, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 30220-260 (e-mail: r.m.faleiro@hotmail.com).

Hospital João XXIII da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Arq Bras Neurocir 2015;34:30–33.

Resumo

A punção líquórica cervical lateral no espaço C1-C2 foi descrita a partir de uma modificação da técnica utilizada para cordotomia percutânea anterolateral. Neste artigo, é descrita uma série de 14 pacientes vítimas de trauma, submetidos à punção líquórica cervical lateral. Todos os procedimentos foram realizados para pesquisa de meningite bacteriana. Presença de escara lombar e occipital, fratura instável de coluna vertebral, tração ou imobilização ortopédica e ventilação mecânica controlada foram os principais motivos para se optar pela punção líquórica cervical lateral. A taxa de sucesso foi de 93%. Não foram evidenciadas maiores complicações per ou pós-procedimento. A punção líquórica cervical lateral se mostrou um método eficaz para obtenção de líquido em pacientes vítimas de trauma, pois não requer mudança de decúbito ou angulação da cabeceira, o que evita complicações em pacientes entubados e com fratura instável de coluna vertebral. Estudos prévios sugerem que a punção líquórica cervical lateral deve ser o método de escolha em pacientes vítimas de trauma com restrição de mobilização.

Palavras-chave

- ▶ punção espinal
- ▶ pressão do líquido cefalorraquidiano
- ▶ ferimentos e lesões

Abstract

The lateral cervical spinal puncture at C1-C2 was described from a modification of the technique used for percutaneous anterolateral cordotomy. In this article, we describe a series of 14 patients of multiple trauma victims who underwent lateral cervical spinal

Keywords

- spinal puncture
- cerebrospinal fluid pressure
- wounds and injuries

puncture. All procedures were performed as a screening for bacterial meningitis. Low back and occipital ulcer, unstable spinal fractures, orthopedic traction or immobilization and ventilated patients were the main reasons to opt for the lateral cervical spinal puncture over standard techniques of liquor puncture. The success rate was 93%. There was not major complication per or post procedural. The lateral cervical spinal puncture proved to be an effective method of obtaining liquor in victims of trauma because it does not requires changing position or rotation of the head, preventing complications in patients with orotraqueal tube and unstable spinal fractures. Previous studies suggest that the lateral cervical spinal puncture should be the method of choice in trauma patients with restriction of mobilization.

Introdução

A punção cervical lateral (PCL), realizada no espaço entre C1-C2, foi inicialmente empregada na cordotomia anterolateral cervical percutânea, em que fibras espinotalâmicas eram interrompidas para alívio de dor de difícil tratamento clínico.¹ A seguir, foi utilizada para realização de mielografia com contraste,² para mielografia gasosa³ e, por fim, para obtenção de líquido.^{4,5} Nos últimos anos, com o advento da ressonância nuclear magnética, esta técnica vem sendo cada vez menos utilizada.

A PCL constitui método alternativo a outras modalidades de punção liquórica, como suboccipital mediana e lombar. Esta técnica (PCL) se torna bem indicada para pacientes traqueostomizados, monitorados, sob respiração assistida, assim como em vítimas de trauma com fraturas em que há contraindicação formal para mobilização no leito.⁴ Nestas situações, há dificuldades técnicas com o emprego das formas padrões de punção liquórica.

As contraindicações para realização da PCL são as mesmas que para a punção lombar e suboccipital, ou seja, infecção local, lesão óssea local, hipertensão intracraniana com risco iminente de herniação, entre outras.⁶

As possíveis complicações da PCL são lesões de estruturas nervosas e vasculares (como punção inadvertida da artéria vertebral extracraniana), precipitação de hérnias em pacientes com hipertensão intracraniana, infecções e cefaleia pós-punção.⁷

A PCL é um método simples, seguro e eficaz para obtenção de líquido em pacientes vítimas de trauma, visto que não requer mudança de decúbito ou da angulação da cabeça, o que evita complicações em pacientes com comprometimento pulmonar e fratura instável de coluna vertebral.

A seguir, é descrita uma série de casos de pacientes vítimas de trauma em que foi realizada a PCL.

Relato de Casos

Foram avaliados 14 pacientes internados no Hospital Pronto-Socorro João XXIII no ano de 2013, vítimas de trauma e submetidos à punção cervical lateral (PCL). Grande parte dos pacientes tinha traumatismo cranioencefálico (TCE) grave à admissão. Os demais foram admitidos com diagnóstico de

acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico, controle de meningite pós-traumática e pós-operatório de hematoma extradural agudo.

Os aspectos analisados em relação aos pacientes e a esta técnica de punção liquórica foram: idade, diagnóstico, número de tentativas para obtenção de líquido, lado puncionado, resultado (obtenção de sucesso ou não) e justificativa para realização da PCL (► **Tabela 1**).

Foram realizados 15 procedimentos, sendo 3 à direita e 12 à esquerda. Em um paciente da série, foram realizados dois procedimentos em momentos distintos. Todos foram realizados com o objetivo de pesquisar presença de meningite bacteriana.

Presença de escara lombar e occipital em 7% dos casos; fratura instável de coluna vertebral, tração ou imobilização ortopédica em 14%; pneumonia e contusão pulmonar grave (ventilação mecânica) em 73% e outras condições em 8% dos casos foram as razões para se optar pela PCL em detrimento das técnicas convencionais de punção liquórica.

A taxa de sucesso foi de 93%. Em apenas um paciente do sexo masculino, de 76 anos e com AVE hemorrágico, não foi obtido sucesso. Não foi evidenciada complicação maior ou menor per ou pós-procedimento, sendo que o nível de consciência e sedação dos pacientes pode ter subestimado complicações sutis.

Discussão

A PCL constitui método alternativo a outras técnicas de punção liquórica, como lombar e suboccipital mediana. No passado, por volta da década de 1980, foi muito utilizada para procedimentos neurorradiológicos.⁷ Com o advento da ressonância nuclear magnética, seu uso com essa finalidade perdeu importância.

Recentemente, a PCL, uma técnica quase esquecida, teve sua relevância retomada no cenário dos pacientes vítimas de trauma, o que pode ser exemplificado pelo seu uso cada vez mais frequente em nosso serviço no Hospital Pronto-Socorro João XXIII. A PCL não requer mobilização no leito ou angulação da cabeceira, o que evita complicações em pacientes traumatizados, em especial aqueles com fratura instável de coluna vertebral. A PCL é um ótimo método de escolha nesses pacientes, em especial aqueles com indicação de mobilização

Tabela 1 Tabela descritiva dos pacientes da série

Paciente	Idade	Diagnóstico	Tentativas	Lado	Sucesso	Justificativa
1*	67	TCE grave fechado	1	Esquerdo	Sim	Ventilação mecânica
2	40	Controle de tratamento de meningite	1	Esquerdo	Sim	Ventilação mecânica
3	35	TCE grave fechado	1	Direito	Sim	Ventilação mecânica
4	34	TCE grave fechado	5	Direito	Sim	Ventilação mecânica
5	76	AVE hemorrágico	8	Esquerda	Não	Ventilação mecânica
6	57	TCE grave fechado	1	Direita	Sim	Ventilação mecânica
7	16	TCE grave fechado	2	Esquerda	Sim	Ventilação mecânica
8	33	Hematoma extradural agudo pós-operatório	2	Esquerdo	Sim	Ventilação mecânica
9	18	TCE grave por PAF	1	Esquerdo	Sim	Ventilação mecânica
10	22	TCE grave fechado	4	Esquerdo		Fratura ortopédica com tração
11	26	TCE grave por PAF	1	Esquerdo	Sim	Escala lombar e occipital
12	44	TCE grave fechado	1	Esquerdo	Sim	Ventilação mecânica
13	16	TCE grave fechado + Fístula líquórica	1	Esquerdo	Sim	Fratura ortopédica com tração
14	21	TCE grave por PAF + fístula líquórica	1	Esquerdo	Sim	Outros

*Neste paciente, foram realizados dois procedimentos em momentos distintos.
Abreviações: AVE, acidente vascular encefálico; PAF, projétil por arma de fogo; TCE, traumatismo cranioencefálico.

em bloco e contraindicação de redução da elevação da cabeceira.

Quanto à descrição anatômica do procedimento, as estruturas contidas no trajeto da agulha são: pele e tecido celular subcutâneo, ligamento cervical posterior, plano muscular (obliquo inferior da cabeça), ligamento atlantoaxial posterior, espaço peridural contendo o plexo venoso vertebral interno e tecido adiposo, e dura-máter⁶ (→ Fig. 1). O trajeto da artéria vertebral é caracteristicamente regular, com poucas variações, o que permite que seja respeitada na PCL, a despeito de sua proximidade. A punção da artéria vertebral extracraniana não traz maiores consequências se a agulha for retirada com cuidado; contudo, sua laceração pode provocar espasmo, trombose, hematoma local e fístula arteriovenosa.⁶ Efeitos deletérios da penetração de medula espinhal por agulha relativamente fina são pouco definidos. Contudo, estudos relatam que a penetração acidental da medula espinhal pode causar o sinal de Lhermitte, que consiste em sensações semelhantes a choques elétricos com irradiação comumente descendente pelo tronco e membros.⁷

Quanto à técnica para realização do procedimento, o paciente deve ser posicionado com a cabeça e o pescoço retificados. Os pontos de referência para a inserção situam-se 1 cm caudal e 1 cm dorsal à ponta da mastoide, observando-se sempre o plano horizontal anatômico. Após realização do

Fig. 1 Tomografia computadorizada do crânio com visualização do trajeto atravessado pela agulha na PCL (traço branco).

Fig. 2 Punção cervical lateral: pontos de referência para inserção da agulha: (1) mastoide; (2) C1-atlas; (3) C2-áxis.

procedimento, recomenda-se repouso de 24 horas para profilaxia da cefaleia pós-punção. Controle radioscópico durante a inserção da agulha para coleta de líquido pode ser dispensado, sendo que o procedimento pode ser realizado

em enfermaria ou no ambulatório, sem desconforto adicional para o paciente⁶ (►Fig. 2).

Conclui-se, portanto, que a PCL é útil em pacientes gravemente enfermos em centros de tratamento intensivo, geralmente em ventilação mecânica ou com restrição de mobilização decorrente de fraturas. Trata-se de técnica simples, segura e com mínimas complicações.

Conflitos de Interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Referências

- 1 Mullan S, Harper PV, Hekmatpanah J, Torres H, Dobbin G. Percutaneous interruption of spinal-pain tracts by means of a strontium 90 needle. *J Neurosurg* 1963;20:931-939
- 2 Kelly DL Jr, Alexander E Jr. Lateral cervical puncture for myelography. Technical note. *J Neurosurg* 1968;29(1):106-110
- 3 Heinz ER, Goldman RL. The role of gas myelography in neuroradiologic diagnosis. Comments on a new and simple technique. *Radiology* 1972;102(3):629-634
- 4 Travassos F, Guedes T, Travassos P. Lateral cervical puncture as a new method for collecting cerebrospinal fluid. Experience in Recife and its metropolitan area. *Arq Neuropsiquiatr* 1988;46(1):88-89
- 5 Zivin JA. Lateral cervical puncture: an alternative to lumbar puncture. *Neurology* 1978;28(6):616-618
- 6 Rossitti SL, Balbo RJ. Lateral cervical puncture for myelography and cerebrospinal fluid collection: technical note. *Arq Neuropsiquiatr* 1988;46(4):397-400
- 7 Rossitti SL, Balbo RJ. Lhermitte's sign during lateral cervical puncture: survey of possible accidents in the lateral C1-C2 puncture and report of 2 cases of spinal cord penetration]. *Arq Neuropsiquiatr* 1990;48(3):341-347