Uso do prontuário eletrônico na assistência pré-natal às portadoras de diabetes na gestação

Electronic Medical Record for Prenatal Care of Diabetic Women

Alina Coutinho Rodrigues Feitosa^{1,2} Amado Nizarala de Ávila^{1,3}

¹ Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, Brasil

² Serviço de Endocrinologia da Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto, Salvador, BA, Brasil

³ Residência de Obstetrícia da Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto, Salvador, BA, Brasil

Address for correspondence: Alina Coutinho Rodrigues Feitosa, PhD, Coordenação de Ensino e Pesquisa da Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto, Rua Marques de Maricá, s/nº, Pau Miúdo, Salvador, BA, Brasil CEP 41500300 (e-mail: alinafeitosa@yahoo.com.br).

Rev Bras Ginec Obst 2016;38:9–19.

Resumo

Objetivo Apresentar e validar um registro eletrônico de saúde (RES) multifuncional para atendimento ambulatorial a portadoras de endocrinopatias na gestação e comparar a taxa de preenchimento de informações de saúde com o prontuário convencional.

Métodos Desenvolvemos um RES denominado Ambulatório de Endocrinopatias na Gestação eletrônico (AMBEG) para registro sistematizado das informações de saúde. O AMBEG foi utilizado para atendimento obstétrico e endocrinológico de gestantes acompanhadas no ambulatório de endocrinopatias na gestação na maternidade referência em gestação de alto risco na Bahia, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013. Aleatoriamente foram selecionadas 100 pacientes atendidas com o AMBEG e 100 pacientes atendidas com prontuário convencional com registro em papel e comparou-se a taxa de preenchimento de informações clínicas.

Resultados Foram realizados 1461 atendimentos com o AMBEG: 253, 963 e 245 respectivamente, admissões, consultas de seguimento e puerpério. Eram portadoras de diabetes 77,2% e sendo 60,1% portadoras de diabetes pré-gestacional. O AMBEG substituiu, satisfatoriamente, o prontuário convencional. O percentual de informações clínicas registradas em ambos os prontuários foi significativamente maior no AMBEG: queixas clínicas (100 versus 87%, $p < 0,01$), altura uterina (89 versus 75%, $p = 0,01$), ganho de peso total (91 versus 40%, $p < 0,01$) e dados específicos sobre o diabetes (dieta, esquema de insulina, controle glicêmico e manejo de hipoglicemias) revelando diferença significativa ($p < 0,01$). A possibilidade de exportar dados clínicos para planilhas facilitou e agilizou a análise estatística de dados.

Palavras-Chave

- ▶ diabetes mellitus
- ▶ gravidez em diabéticas
- ▶ diabetes gestacional
- ▶ sistemas computadorizados de registros médicos
- ▶ doenças do sistema endócrino

received
July 31, 2015
accepted
October 14, 2015

DOI <http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1570109>
ISSN 0100-7203.

Copyright © 2016 by Thieme Publicações Ltda, Rio de Janeiro, Brazil

License terms

Abstract**Keywords**

- ▶ diabetes mellitus
- ▶ pregnancy in diabetics
- ▶ gestational diabetes
- ▶ medical records systems
- ▶ computerized
- ▶ endocrine system diseases

Conclusões O AMBEG é uma ferramenta útil no atendimento clínico a mulheres portadoras de endocrinopatias na gestação. A taxa de preenchimento de informações clínicas foi superior à do prontuário convencional.

Objective To present and validate a multifunctional electronic medical record (EMR) for outpatient care to women with endocrine disorders in pregnancy and to compare health information data fill rate to conventional medical records.

Methods We developed an EMR named Ambulatory of Endocrine Diseases in Pregnancy (AMBEG) for systematic registration of health information. The AMBEG was used for obstetric and endocrine care in a sample of pregnant women admitted to the maternity reference in high-risk pregnancies in Bahia from January 2010 to December 2013. We randomly selected 100 patients accompanied with AMBEG and 100 patients monitored with conventional consultation and compared the health information data fill rate of the electronic consultation to that performed using conventional medical records.

Results 1461 consultations were held, of which 253, 963 and 245 were first, follow-up and puerperium consultations, respectively. Most patients were pregnant women with diabetes (77.2%) and 60.1% were women with pre-gestational diabetes. The AMBEG satisfactorily replaced the conventional medical record. The percentage of registered information was significantly higher in the AMBEG: clinical symptoms (87% versus 100, $p < 0.01$), uterine height (89 versus 75%, $p = 0.01$), total weight gain (91 versus 40%, $p < 0.01$) and specific diabetes data (diet, insulin regimen, glycemic control and management of hypoglycemia) revealed a significant difference ($p < 0.01$). The ability to export data to worksheets greatly facilitated and accelerated the statistical analysis of the data.

Conclusions AMBEG is a useful tool in clinical care for women with endocrine diseases during pregnancy. The fill rate of clinical information was superior to that registered in conventional medical records.

Introdução

A presença de diabetes mellitus na gestação está associada a elevado risco de complicações.¹ É uma condição que consome recursos de saúde² e atenção especializada. A prevalência do diabetes pré-gestacional e do gestacional tem aumentando nos últimos anos e pode ser justificada pela epidemia de obesidade^{3,4}, aumento da idade materna⁴ e pelo recente e sensível critério para diagnóstico do diabetes gestacional.⁵ A fim de reduzir a chance de maus desfechos, gestantes portadoras de diabetes devem ter assegurada a sua assistência pré-natal em centros de referência especializados e, preferencialmente, terem acompanhamento multidisciplinar. Intervenções dietéticas, mudanças no estilo de vida, monitoração das glicemias, manutenção dos alvos glicêmicos rigorosos, pré-natal com vigilância específica e controle do peso são indispensáveis para otimizar as metas de tratamento e os desfechos materno-fetais⁶, entretanto exigem, do médico e da equipe de saúde, sistematização do atendimento, seguimento das diretrizes e rigor na avaliação e conduta.

Tecnologias de informação e comunicação em saúde (TICS) tem o potencial de otimizar a eficiência e efetividade dos profissionais de saúde.⁷ Dentre as TICS, o prontuário eletrônico

do paciente (PEP) é a principal ferramenta. Outro recurso utilíssimo, embora com menos funcionalidades, é o registro eletrônico de saúde (RES), que é um repositório de informação a respeito da saúde de indivíduos, processável eletronicamente e que permite armazenamento e compartilhamento de informações. No RES a informação é mais disponível e atualizada, os dados têm maior legibilidade, acurácia e exatidão e, por meio de sistemas de alerta e apoio à decisão terapêutica associados ao RES, a possibilidade de erro é potencialmente reduzida, aumentando a segurança para o paciente.⁷

O uso do RES em portadores de diabetes está associado a melhores taxas de intensificação de tratamento, monitoração, seguimento e otimiza o controle glicêmico e lipídico.⁸ O PEP e o RES, tornam-se então, hipoteticamente, ferramentas atraentes para o atendimento da gestante portadora de diabetes onde a otimização clínica, com objetivo de normoglicemia, assegura melhor desfecho materno-fetal. Entretanto não há, ao nosso conhecimento, RES brasileiro validado para atendimento desta população específica.

O objetivo do presente estudo é apresentar um registro eletrônico de saúde desenvolvido para atendimento de portadoras de endocrinopatias na gestação, com ênfase em diabetes, e os resultados do acompanhamento de gestantes no período de

três anos, comparando a taxa de preenchimento das informações do prontuário eletrônico ao convencional.

Métodos

O presente trabalho reporta o desenvolvimento e a validação de um aplicativo de banco de dados para atendimento de gestantes portadoras de diabetes no pré-natal e um estudo do tipo caso-controle para comparar o atendimento médico por meio do prontuário eletrônico ao convencional.

Foi desenvolvido um aplicativo do banco de dados do Microsoft Access®, denominado Ambulatório de Endocrinopatias na Gestação eletrônico (AMBEG), para o registro eletrônico sistematizado de informações de saúde para o atendimento médico obstétrico e endocrinológico. Após o desenvolvimento e teste, o AMBEG foi utilizado para o atendimento clínico de uma amostra populacional consecutiva de pacientes acompanhadas ao ambulatório de endocrinopatias na gestação da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Netto (MPJMMN) durante o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa local.

Para o desenvolvimento do AMBEG utilizou-se o aplicativo Microsoft Access®, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft que permite o desenvolvimento rápido de aplicações que envolvem modelagem, estrutura de dados e interface a ser utilizada pelos usuários. É capaz de utilizar dados armazenados em *access/jet*, *Microsoft SQL Server*, *Oracle* e quaisquer dados compatíveis com *Open Database Connectivity*. Os campos de dados, formato de distribuição, construção dos formulários foram criados a partir da organização habitual dos prontuários no atendimento convencional, sequenciando a ordem de entradas dos campos de acordo com a entrevista médica. Com o foco no acompanhamento do diabetes, foram acrescentados campos que garantissem a entrada de dados sobre todos os aspectos relevantes do acompanhamento clínico como: dieta, tratamento, automonitoração, uso de insulinas e hipoglicemias. Foram criadas telas para atendimento à primeira consulta, acompanhamento evolutivo da paciente (“retorno”), registro de dados laboratoriais, ultrassonografia obstétrica e dados de puerpério da portadora de patologias endocrinológicas na gestação. O AMBEG seguiu as orientações e incluiu todos os itens obrigatórios do prontuário eletrônico definidos pela resolução do CFM n. 1.638/2002.⁹

Os usuários do AMBEG foram o médico endocrinologista e os médicos residentes de obstetria e endocrinologia que cumpriam estágio regular no ambulatório de endocrinopatias na gestação. Os médicos usuários eram ensinados a utilizar o AMBEG através de demonstração breve de cerca de dez minutos e treinados durante um atendimento. O aplicativo é autoexplicativo e tem campos com mensagens, caixas de listas e máscaras que controlam a entrada de dados. Ao final da consulta, o atendimento era impresso, assinado e arquivado.

A avaliação do desempenho do aplicativo foi feita por meio da comparação da taxa de preenchimento de dados do atendimento no prontuário preenchido a mão, denominado

“atendimento convencional” com a do preenchimento no prontuário eletrônico, denominado “atendimento eletrônico”. Consideramos a diferença da taxa de preenchimento do dado “queixas clínicas” como o desfecho principal para o cálculo do tamanho amostral. Estimando-se uma diferença média na taxa de preenchimento de 15%, com o poder de 80% e o nível de significância de 5%, o tamanho da amostra calculado para cada grupo foi de 99 indivíduos. Por meio de números aleatórios gerados em Microsoft Excel® foram selecionados 100 prontuários preenchidos por atendimento convencional e 100, por atendimento eletrônico.

As informações registradas no atendimento do primeiro retorno foram utilizadas para comparar a taxa de preenchimento de informações entre os dois tipos de atendimento. Foram escolhidas variáveis consideradas pelos autores como essenciais e representativas do atendimento à portadora de diabetes na gestação e categorizados em nove domínios de dados: 1. Dados sobre queixas: descrição de presença ou negação de queixas clínicas ou obstétricas; 2. Datação da gestação: descrição da idade gestacional; 3. Exame físico: descrição da pressão arterial, altura do fundo uterino, peso materno e ganho total de peso; 4. Aspectos nutricionais: descrição do uso de adoçante artificial e descrição de aderência ou não à dieta; 5. Uso de medicações: descrição de hipoglicemiantes orais e de suplementos maternos; 6. Dados sobre insulinoterapia: informação sobre o uso de insulina e esquema de insulinização; 7. Dados de automonitoração: registro de percentuais de glicemia acima, dentro e fora da meta; 8. Dados sobre hipoglicemias: descrição sobre história de hipoglicemia no período interconsulta e sobre reconhecimento e tratamento de hipoglicemias; descrição sobre o uso ou não do cartão do diabético; 9. Dados sobre conduta: informações sobre alteração ou não da conduta. Era considerada informação “presente” quando o campo estava preenchido e “ausente” quando não houvesse informações.

Todos os dados inseridos nos campos da entrevista médica eram, por comando simples, exportados para planilhas de Excel, que possibilitavam a análise estatística.

A análise estatística foi feita com programa SPSS v. 20.0 para Windows™. Os dados dos registros eletrônicos foram expressos como média e desvio-padrão ou mediana e variação e as variáveis categóricas, como valor absoluto e percentual. Variáveis com dados dicotômicos foram comparadas utilizando-se o teste do qui-quadrado ou pelo exato de Fisher.

Resultados

O AMBEG foi desenvolvido com uma tela primária, para direcionamento da navegação por meio de botões de cadastro de egressas, acesso à primeira consulta e retornos e o fechamento da ferramenta (– Figs. 1–8).

A anamnese completa e exame físico foram registrados nos campos da tela “primeira consulta” e as abas na borda superior davam acesso às telas de “retorno”, “puerpério”, “lab e imagem” e “USG”, onde eram inseridos, a cada consulta, respectivamente, dados sobre a evolução durante a gravidez, do puerpério, exames laboratoriais, de imagem e

Ambulatorio de Endocrinopatias na Gestacao

Bem Vindo Dr(a)! Este é o AMBEG - Ambulatorio de Endocrinopatias na Gestacao da Maternidade Prof. Jose Maria de Magalhaes Netto. Por favor, antes de iniciar o atendimento, cadastre a sua paciente no cadastro de pacientes. Para inserir dados de primeira consulta e retornos, clique no botao

Cadastro de Pacientes

Primeira consulta e retornos

Fechar AMBEG

Fig. 1 Tela inicial.

ultrassonografia obstétrica. Em todas as telas de atendimento existiram campos alfa numéricos, que permitem escrita livre; campos numéricos, para variáveis contínuas como peso, altura, pressão arterial, altura do fundo uterino, batimentos fetais, idade gestacional, etc.; campos apoiados por listas permitem entradas categóricas predeterminadas e campos numéricos com cálculos automáticos, para otimizar e agilizar o atendimento como o cálculo da idade gestacional (IG) e data prevista do parto pela data da última menstruação (DUM) e a primeira ultrassonografia; ganho de peso total e semanal, índice de massa corpórea (IMC), dose total diária (DTD) de insulina e dose por quilo de peso, intervalo de tempo entre consultas, etc.

Os usuários do AMBEG foram os médicos endocrinologistas e residentes de endocrinologia e obstetrícia, sendo que, estes últimos, faziam estágio regular no ambulatório de endocrinopatias na gestação por período de dois meses. A maioria dos médicos que utilizaram o AMBEG relataram estar muito satisfeitos com o uso e a impressão foi que o AMBEG era de fácil manejo, capaz de organizar a sequência de atendimento e minimizar falhas. Os cálculos automáticos no AMBEG auxiliaram e agilizaram o atendimento, segundo os usuários (dados não mostrados).

Durante o período de utilização, a necessidade de suporte técnico foi mínima e não ocasionou nenhum prejuízo ao atendimento.

RG mater: 434321

Jennifer Silva Idade: 24 Localizar Paciente (RG ou nome)

Retornos Primeira Consulta Puerperio Lab e Imagem USG Abas de acesso às telas acessórias

Primeira Consulta

Data da consulta: 26/04/2013

Diagnóstico principal de encaminhamento: DMP

História: refere diagnóstico de diabetes há 01 ano e uso regular de glibenclâmida (10mg/dia) e metformina (2550g/dia). Ao detectar a gestação, no segundo mês, parou as medicações e procurou médico.

☒ Gestacao Planejada ☒ Gestacao Desejada

Cálculos automáticos

DUM: 20/12/2012

Data 1USG: 14/01/2013 IGUSG: 4 sem 2 dias

DPPDUM: 26/09/2013 IG atual (DUM): 18sem 1d

DPP1USG: 25/09/2013 IG atual 1 USG: 18sem 6d

Gesta: 2 Para: 1 Aborto: 0

Comorbidades na mãe

☐ Nodulo tir ☐ Hipertireoidismo ☐ HAS ☐ Tabag ☐ Hipotireoidismo ☐ Obesidade ☐ DLP ☐ Drogas

Quais comorb: rinite alérgica

Medicacoes em uso: sulfato ferroso

Fig. 2 Tela de primeira consulta (demonstração parcial).

Portadoras de Diabetes

Tipo de DM: 2 Tempo DM: 1 Ano Dx DM: 2012

Modo Dx DM: glicemia em jejum

GJ ao Dx: 146 Data GJ Dx: 01/01/2012 IG GJ Dx:

TTGO 75g: Data TTGO: IGTTGO:

☒ Faz dieta ☐ Nutricionista Mater ☒ Adocante Qual? ciclamato ☐ AutoMonitorização

☐ usa MTF DoseMTF: ☐ Gliben Dose Glibe: ☐ Medidas por Semana:

Regular: + + DosTot: ☐ Correcao **Cálculos automáticos**

NPH: + + + DosTotKg: ☐ Num Insulina:

☐ CartaoDM ☐ Rodizio ☐ Aplic Pern ☐ Aplica Abdomen ☐ Aplic Brac ☐ Aplic Gluteo

☐ Sabe o que e hipo ☐ Ja teve hipo ☐ Teve hipo grave ☐ Tem hipo na madrugada

☐ Sabe reconhecer hipo ☐ TrataHipo

Exame físico

Peso pre G: 65 Altura: 1.63 IMC preG: 24.46 **Cálculos automáticos**

Peso atual: 68 IMC atual: 25.59

Ganho atual: 3 Ganho Ideal: 11.5-16kg Status do peso: Ideal

Alt uterina: 18 FC fetal: 152

PAS: 120 PAD: 070

Fig. 3 Tela de primeira consulta, parte específica para as diabéticas (demonstração parcial).

Retornos Primeira Consulta Puerperio Lab e Imagem USG

Retorno

Data do retorno: 26/04/2013 Atendida por: Dra Alina Feitosa Intervalo da Consulta (sem): 2

Queixas: refere movimentação fetal presente, nega disúria, perda de líquido ou sangue, nega fluxo vaginal, prurido ou odor. Fazendo uso de insulinas e sulfato ferroso

Medicacoes usadas: sulfato ferroso e insulinas

DUM: 20/12/2012 IGDUM: 18sem 1d Dat 1USG: 14/01/2013 IG 1USG: 4 2 IG atual 1 USG: 18sem 6d **Cálculos automáticos**

Exame Físico

Peso hoje: 69 Ganho Total: 4.00 **Cálculos automáticos**

Peso ultima consulta: 68 Ganho sem: 0.50

Peso pre G: 65 FC fetal: 152

Impressão sobre ganho semanal: Ideal

Altura: 1.63 IMC atual: 25.97

PAS: 110 PAD: 70 Tem Edemas Não

Altura uterina: 18 Tem acantose Não

Exame físico: sem estase de jugulares, ACV: BRNF em 2T sem sopros, AR: MVBd sem RA, abd: vide acima

Nutricao

Faz dieta: Sim

Nutri na mater: Sim

Grau de aderencia a dieta: ótimo

Usa adocante: Sim

Tipo de adoçante: sucralose

HGT nesta consulta: 89

Medicacao tireoide

☐ Levo Dose Levotiroxina:

Novo retorno

Fig. 4 (a) Tela de retorno à consulta (demonstração parcial). (b) Tela de retorno à consulta, avaliação específica da diabética gestante, incluindo a conduta (demonstração parcial).

Para portadoras de diabetes

Antidiabéticos orais		Automonitorização	
Usa metformina	Não	Automonitoriza	Sim
DoseMetformina:		Entende controle	Sim
		Total de medidas	45
		Glicemias ideais (%)	78
		Glicemias acima (%)	12
		Hipoglicemias (%)	10

Insulinoterapia	
Regular	6 + 6 + 4
NPH	12 + 10 + 0 + 10
Dose Total diária:	48
Dose total por Kg:	0.71
Numero de aplicacoes:	4
Entende insulinoterapia	ótimo
Rodizio:	Não
Usa correção	Não
☒ Aplica no abdomen ☒ Aplica no braco ☒ Aplica no glúteo ☒ Aplica na perna	

Hipoglicemia	
Teve hipoglicemias	Não
Reconhece hipo	Sim
Hipoglicemias graves	Não
Trata hipos	Sim
Hipo na madrugada	Não
Tem cartão DM	Sim

Conduta	
Mudara o esquema:	Sim
Novo esquema de insulina	8 + 6 + 6
Dose Total diária:	54
Dose Total por Kg:	0.78
Conduta:	ajustamos doses de insulinas e reforçamos sinais e sintomas de hipoglicemias. Retorno em 02 semanas.

Cálculos automáticos

Fig. 5 Tela de retorno à consulta – avaliação específica para diabetes.

Por meio do aplicativo eletrônico 319 pacientes foram atendidas. Considerando-se primeiras consultas e consultas de retorno e puerpério, um total de 1460 atendimentos foram realizados no período avaliado, sendo 252 primeiras consultas, 963 “retornos” e 245 avaliações em puerpério. Sessenta e sete pacientes foram registradas pela primeira vez na tela “Retorno”, mas eram primeira consulta. Havia sido admitidas e feita a primeira consulta na internação, em prontuário preenchido a mão.

Dados sobre a primeira consulta estão sumarizados na ►Tabela 1 ($n = 246$). A média de idade materna foi de 32 ± 10 anos e idade gestacional de $25 \pm 7,8$ semanas. O principal motivo de encaminhamento ao endocrinologista foi o diabetes (77,2%), seguido de patologias tireoidianas. O diabetes pré-gestacional foi o principal tipo de diabetes encaminhado correspondendo a 60,1% dos casos (►Tabela 1).

A comparação da frequência de registro de informações nos nove domínios de dados entre os dois tipos de atendimento está demonstrada na ►Tabela 2. A frequência do registro de dados foi significativamente maior no atendimento por prontuário eletrônico que pelo convencional nos

campos de Queixas (100 versus 87%, $p < 0,01$), altura do fundo uterino (89 versus 75%, $p = 0,01$), ganho total de peso (91 versus 40%, $p < 0,01$) e questões específicas para as portadoras de diabetes: dieta (81,5 versus 8,4%, $p < 0,01$), esquema de insulina (70,4 versus 41%, $p < 0,01$), controle glicêmico (63 versus 15,7%, $p < 0,01$), história de hipoglicemias (72,8 versus 33,7%, $p < 0,01$), reconhecimento (72,8 versus 33,7%, $p < 0,01$) e tratamento de hipoglicemias (72,8 versus 33,7%, $p < 0,01$) e se porta consigo o cartão de diabetes (72,8 versus 30,1%, $p < 0,01$).

Discussão

O uso da informação clínica eletrônica tem o potencial de melhorar a qualidade e a eficiência do cuidado médico.^{10,11} No presente trabalho apresentamos um RES, o AMBEG, que foi desenvolvido para o atendimento a portadoras de endocrinopatias na gestação, com ênfase em diabetes. Neste trabalho também relatamos a experiência com três anos de assistência clínica endocrinológica utilizando o AMBEG e o desempenho do novo aplicativo comparado ao prontuário convencional.

Retornos	Primeira Consulta	Puerperio	Lab e Imagem	USG							
<h2>Exames Laboratoriais e Imagem</h2>											
<div> <div>DataLab: 14/01/2013</div> <div>novos dados</div> </div>											
<h3>Metabolismo glicidico</h3>		<h3>Rastreamento de complicacoes do diabetes</h3>									
Glic Jej:	123	MA24h:	3.0								
Glic Pos Prandial:	134	FO:	sem alteracoes								
HbA1c:	4.3	ECG:	ritmo sinusal, fc 89								
VRHbA1c:	2.5-4.5%		Doppler Carotidas:	sem alteracoes							
Fruto:	234		Monofilamento:	toque percebido							
TTGO 75:	78	145	Diapasao:	nao testado							
123											
<h3>Tireoide</h3>		<h3>Outros exames</h3>									
TSH:	1.2	antiTPO:	12	Hb:	12.3	Leuco:	2345	Na:	123	CaT:	9.4
T4L:	1.23	antiTG:	12	Ht:	32.4	Plaqueta:	123000	K:	4.6	HDL:	56
T3:	0.89	TRAB:	13	AST:	23	U:	16	CT:	179	TG:	145
ioduria:	123			ALT:	24	Cr:	0.91			LDL:	123
				Outros:	fez USG da tireoide.						

Fig. 6 Tela para exames laboratoriais e de imagem (tireoide).

Retornos	Primeira Consulta	Puerperio	Lab e Imagem	USG
<h2>Ultrassonografia Obstétrica</h2>
Data do USG: <input type="text" value="14/03/2013"/>		<input type="button" value="Novo USG"/>		
IG <input type="text" value="12"/> sem <input type="text" value="4"/> dias		DPP pelo USG <input type="text" value="30/09/2013"/>		
Peso fetal:	<input type="text" value="345"/>	Percentil de Peso:	<input type="text" value="50"/>	
Circunferencia abd (CA):	<input type="text" value="123"/>	Rel CACC:	<input type="text" value="0.92"/>	
Circunferencia cefalica (CC):	<input type="text" value="134"/>	Indice de Liq. Amn.:	<input type="text" value="4.0"/>	
IR Art. Umbilical:	<input type="text" value="0.45"/>	IR Art. Uterina D:	<input type="text" value="0.67"/>	
IR Art. Uterina E:	<input type="text" value="0.78"/>	IR Art. Cerebral M:	<input type="text" value="0.67"/>	
Comentarios:	<input type="text" value="nodulos de mioma"/>			
<input type="button" value="Salvar"/>		<input type="button" value="Imprimir"/>		

Fig. 7 Tela para exame de ultrassonografia obstétrica.

Puerperio

Data do parto: 31/12/2009 Data da consulta: Novo retorno puerperio

Queixas:

Sobre o RN

Tipo de parto: cesario ☐ Fototerapia Hb:

Peso RN1: 3450 ☐ UTI Bil Total:

Peso RN2: ☐ Malformacao Hipoglic RN: Não sabe

IG parto: 39.0 ☐ Distocia Calcio:

Sobre a mae

☒ Saiu de alta com insulina ☒ usando MTF ☒ Faz dieta ☒ Adocante ☒ Esta usando insulina ☐ Amamenta ☐ Amamentacao exclusiva

Peso Atual: 58.0 Peso pre parto: 69 Delta peso: 11.0

Dose MTF: 1700 PAS: 130

Medicacoes 1: captopril PAD: 92

Medicacoes 2: AAS HGT: 157

Insulina Reg: 0+ 0+ 0 DoseTotal: 25

Insulina NPH: 10+ 5+ 0+ 10 Dose Total Kg: 0.43

Cálculos automáticos

Fig. 8 Tela para atendimento no puerpério (demonstração parcial).

Nos últimos anos tem havido especial interesse e investimento em tecnologias de informação e comunicação em saúde em várias partes do mundo.¹⁰ No Brasil, o PEP/RES vem sendo utilizado com crescente frequência e resolução do CFM regulamenta o seu uso.⁷ Evidências se avolumam sobre a importância dos PEP nos cuidados clínicos^{10,11} e melhoria da qualidade da assistência ambulatorial.¹² em diabetes, o uso de prontuários eletrônicos tem o potencial de contribuir nos cuidados e prevenção de morbidades,¹³ auxiliando na solicitação de exames de rastreamento¹⁴ e recomendações específicas sobre medicações como insulinas. Na assistência ao diabetes fora do período gestacional, o uso do PEP completo e certificado está associado a melhoria nas taxas de intensificação do tratamento, seguimento, monitoramento, controle lipídico e glicêmico,⁸ a menos visitas às emergências e internações.¹⁵ Entretanto poucas pesquisas tem sido conduzidas sobre registros eletrônicos de saúde no campo dos cuidados pré- e perinatais na portadora de diabetes¹⁶ e desconhecemos publicações brasileiras sobre o assunto. No presente estudo um RES foi criado e testado para assistência específica à portadora de doença endócrina na gestação com ênfase em diabetes, minimizando esta lacuna de conhecimento. Os dados obtidos dos atendimentos por meio do prontuário eletrônico demonstraram que a principal doença motivadora do encaminhamento obstétrico ao endocrinologista foi o diabetes, refletindo a frequência, impacto da doença na gestação e a procura por serviço de atendimento especializado. A população avaliada demonstrou ser de elevado risco pois a maioria eram portadoras de diabetes prévio à gestação.

Os médicos que utilizaram o AMBEG aprenderam rapidamente como operar o RES. Relataram estar satisfeitos com as funcionalidades, referiram ser de fácil manejo e capaz de organizar a sequência de atendimento, minimizando falhas. Reportaram também que os cálculos automáticos foram úteis e agilizaram o atendimento. Ainda que ginecologistas e obstetras revelem elevada satisfação com os sistemas eletrônicos para atendimento ao paciente¹⁷, idade mais avançada do médico, sexo masculino e atendimento clínico solitário foram barreiras para a implementação de prontuários eletrônicos. O RES do presente estudo teve elevada aceitação e fácil implementação possivelmente por serem os usuários médicos com pouco tempo de formação.

O presente trabalho também demonstrou a facilidade no acesso às informações coletadas, armazenamento e análise dos dados clínicos registrados eletronicamente. O registro clínico em prontuários preenchido a mão impõe dificuldades no acesso e levantamento de dados, limitando avaliações de qualidade de atendimento, consultas e pesquisas médicas. O registro eletrônico no AMBEG possibilitou a exportação rápida de informações com a criação de bancos de dados. Os campos estruturados permitiram consulta rápida e análise, fornecendo informações para pesquisas e levantamentos epidemiológicos. A utilização de dados de prontuários eletrônicos para dar suporte a pesquisas clínicas é uma tendência mundial e iniciativas, como o projeto *Electronic Health Records for Clinical Research*¹⁸, procuram desenvolver inventário de dados necessários para dar suporte a pesquisas por meio de PEP. Nosso estudo demonstra a utilidade do RES para pesquisas e levantamentos epidemiológicos.

Tabela 1 Dados clínicos das gestantes na primeira consulta (expressos em média e desvio-padrão, valor absoluto e percentual)

Variáveis	Todas (n = 252)** n = 246	Somente DM (n = 193)** n = 183
Idade (anos)	32 ± 10	32 ± 10
IG (semanas)	25 ± 7,8	25,5 ± 7,9
Diagnóstico ao encaminhamento*	DMP n = 107 (43,5%); DMG n = 83 (33,7%); Tir n = 45 (18,3%); Obes n = 3 (1,2%); Hip n = 1 (0,4%); Outros† n = 7 (2,9%)	DM1 n = 25 (13,7%) DM2 n = 65 (46,4%) DMG n = 73 (39,9%)
Peso pré-gestacional (kg)	72,4 ± 16,8	73,6 ± 16,7
IMC pré-gestacional (kg/m ²)	28,5 ± 6,1	28,9 ± 6,0
Peso na PC (kg)	79,8 ± 16,8	81 ± 16,3
Ganho de peso até PC (kg)	7,7 ± 7,9	7,5 ± 6,7
Glicemia capilar na PC (mg/dl)	138 ± 65,5	146 ± 68,5

Abreviações: DM, diabetes mellitus; DM1 diabetes mellitus tipo 1; DM2 diabetes mellitus tipo 2; DMG diabetes gestacional; DMP diabetes mellitus pré-gestacional; Hip doenças hipotálamo hipofisárias; IG, idade gestacional; IMC, índice de massa corpórea; Obes, obesidade; PC, primeira consulta; Tir, doenças tireoidianas; †outras patologias endocrinológicas

*patologia que motivou o encaminhamento ao ambulatório de endocrinopatias na gestação.

**no grupo *Todas*, n = 6 estavam sem a identificação da patologia à primeira consulta; no grupo *Somente DM*, em 10 não havia a definição do tipo de diabetes.

Tabela 2 Frequência de preenchimento dos dados clínicos conforme tipo de prontuário (n = 200)

Variável	P. eletrônico (n = 100)	P. convencional (n = 100)	
	%	%	p
Queixas	100	87	< 0,01
Datação da gestação	91	83	0,09
Pressão arterial	93	92	0,79
Altura do fundo uterino	89	75	0,01
Peso materno	96	92	0,23
Ganho total de peso	91	40	< 0,01
Glicemia capilar na consulta	80	77	0,61
Conduta	95	97	0,47
Portadoras de diabetes mellitus (n = 164)	% (n = 81)	% (n = 83)	p
Adoçante	81,5	63,9	0,01
Dieta para diabetes	81,5	8,4	< 0,01
Hipoglicemiantes orais	84	73,5	0,10
Uso de insulina	88,9	80,7	0,15
Esquema de insulina	70,4	41	< 0,01
Controle glicêmico (percentuais dentro do alvo)	63	15,7	< 0,01
História de hipoglicemias	72,8	33,7	< 0,01
Reconhece hipoglicemias	72,8	33,7	< 0,01
Sabe tratar hipoglicemias	72,8	33,7	< 0,01
Tem o cartão da diabética?	72,8	30,1	< 0,01

A frequência do registro de dados clínicos considerados relevantes na consulta foi significativamente maior no atendimento feito com o AMBEG em relação ao atendimento convencional, em papel. A estruturação dos campos de dados de consulta, a legibilidade, praticidade e os cálculos automáticos provavelmente auxiliaram na organização do atendimento e na lembrança do questionamento dos dados da consulta. Estas funcionalidades e os resultados do presente estudo seguem a direção atual dos conhecimentos que demonstram a utilidade do registro eletrônico em melhorar a qualidade do registro clínico.¹⁹ Em contrapartida a falta de documentação de informações do pré-natal resulta em impacto negativo nos escores de adequação dos cuidados pré-natais²⁰ e possivelmente o fato de haver melhor documentação de dados poderia resultar em melhoria na qualidade de assistência.

Apresentaram-se como limitações do trabalho, o tipo do PEP e a ausência de avaliação dos desfechos materno-fetais. O AMBEG é um PEP básico, que funciona como um registro eletrônico de saúde. Os PEP completos²¹ oferecem outras funcionalidades consideradas importantes para o manejo clínico.²² Entretanto, o AMBEG é um aplicativo transitório e em evolução. A ele poderão ser, posteriormente, integradas funcionalidades avançadas como a interoperacionalidade com outros sistemas (laboratório, imagem, prontuários de outras unidades), inserção de ordem de cuidados médicos eletrônica (prescrição, requisição de exames), incorporação de *links* com informações médicas para educação continuada e sistemas de alertas e avisos que funcionam como apoio a decisão diagnóstica e terapêutica. Adicionalmente, o registro de informações foi significativamente mais frequente na consulta realizado com o AMBEG, entretanto não avaliamos o impacto do uso na qualidade da assistência pré-natal e perinatal da gestante portadora de diabetes. Acreditamos que a sistematização do atendimento e o preenchimento mais completo dos dados relevantes da consulta possam se associar a redução de eventos maternos e fetais, o que poderá ser investigado em outros estudos. A informação sobre o tempo de atendimento não foi registrada para permitir a comparação, portanto não podemos assegurar se o prontuário eletrônico reduz o tempo de consulta, mas esta funcionalidade também pode ser agregada ao aplicativo possibilitando avaliações futuras.

Como pontos fortes do trabalho destacamos a originalidade do RES e ausência de publicações sobre o assunto na literatura brasileira. Diante das dificuldades de assistência em saúde no Brasil, da crescente prevalência do diabetes na gestação com suas complicações e da necessidade de padronização de atendimento e da conduta para otimizar as metas em saúde, demonstramos a utilização de uma ferramenta de baixo custo com suporte técnico mínimo capaz de aumentar a frequência do registro de dados clínicos no pré-natal de portadoras de diabetes na gestação. A maior frequência de registro de dados clínicos sobre hipoglicemias merece destaque pois estas informações representam atenção dedicada à segurança para a binômio materno-fetal o que poderia reduzir morbidades. O AMBEG tem o potencial de melhorar a assistência pré-natal de alto risco, incorporar tecnologias para otimizar os desfechos clínicos através da facilitação de aderência aos protocolos clínicos e assistenciais, oferecer

mais segurança à paciente, além de proporcionar fonte de dados para levantamentos epidemiológicos e tratamento estatístico úteis para programas de atenção especializada ao diabetes na gestação e pesquisa clínica.

O registro eletrônico AMBEG é uma ferramenta de baixo custo, com necessidade de mínimo suporte técnico e fácil utilização que aumentou a frequência de registro de informações da consulta e padronizou o atendimento clínico a mulheres portadoras de endocrinopatias na gestação, com ênfase no diabetes. O potencial de expansão da ferramenta é amplo com perspectiva de melhora no atendimento por meio de tecnologia incorporada como alertas e interoperacionalidade com outros sistemas ambulatoriais e hospitalares. Recomenda-se mais estudos para avaliar o impacto a utilização da ferramenta nos desfechos clínicos.

Referências

- 1 Metzger BE, Gabbe SG, Persson B, et al; International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Consensus Panel. International association of diabetes and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. *Diabetes Care* 2010;33(3):676–682
- 2 Law A, McCoy M, Lynen R, et al. The prevalence of complications and healthcare costs during pregnancy. *J Med Econ* 2015;18(7):533–541
- 3 McIntyre HD, Gibbons KS, Flenady VJ, Callaway LK. Overweight and obesity in Australian mothers: epidemic or endemic? *Med J Aust* 2012;196(3):184–188
- 4 Morikawa M, Yamada T, Yamada T, Sato S, Cho K, Minakami H. Prevalence of hyperglycemia during pregnancy according to maternal age and pre-pregnancy body mass index in Japan, 2007–2009. *Int J Gynaecol Obstet* 2012;118(3):198–201
- 5 Mayo K, Melamed N, Vandenberghe H, Berger H. The impact of adoption of the international association of diabetes in pregnancy study group criteria for the screening and diagnosis of gestational diabetes. *Am J Obstet Gynecol* 2015;212(2):224.e1–224.e9
- 6 American Diabetes Association. (12) Management of diabetes in pregnancy. *Diabetes Care* 2015;38(Suppl):S77–S79
- 7 Conselho Federal de Medicina. Cartilha sobre Prontuário Eletrônico: a certificação de sistemas de Registro Eletrônico de Saúde. Brasília (DF): CFM; 2012
- 8 Reed M, Huang J, Graetz I, et al. Outpatient electronic health records and the clinical care and outcomes of patients with diabetes mellitus. *Ann Intern Med* 2012;157(7):482–489
- 9 Conselho Federal de Medicina [Internet]. Resolução CFM n. 1638 de 9 de agosto de 2002. Define prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde. 2002 (cited 2013 Apr 26). Available at: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
- 10 Nguyen L, Bellucci E, Nguyen LT. Electronic health records implementation: an evaluation of information system impact and contingency factors. *Int J Med Inform* 2014;83(11):779–796
- 11 Ancker JS, Kern LM, Edwards A, et al; HITEC Investigators. Associations between healthcare quality and use of electronic health record functions in ambulatory care. *J Am Med Inform Assoc* 2015;22(4):864–871
- 12 Kern LM, Edwards AM, Pichardo M, Kaushal R. Electronic health records and health care quality over time in a federally qualified health center. *J Am Med Inform Assoc* 2015;22(2):453–458
- 13 Eggleston EM, Klompas M. Rational use of electronic health records for diabetes population management. *Curr Diab Rep* 2014;14(4):479

- 14 Corser W, Yuan S. Mixed influence of electronic health record implementation on diabetes order patterns for Michigan Medicaid Adults. *J Diabetes Sci Tech* 2015
- 15 Reed M, Huang J, Brand R, et al. Implementation of an outpatient electronic health record and emergency department visits, hospitalizations, and office visits among patients with diabetes. *JAMA* 2013;310(10):1060–1065
- 16 Jolles DR, Brown WW III, King KB. Electronic health records and perinatal quality: a call to midwives. *J Midwifery Womens Health* 2012;57(4):315–320
- 17 Raglan GB, Margolis B, Paulus RA, Schulkin J. Electronic health record adoption among obstetrician/gynecologists in the United States: physician practices and satisfaction. *J Healthc Qual* 2015; [Epub ahead of print]
- 18 Doods J, Botteri F, Dugas M, Fritz F; EHR4CR WP7. A European inventory of common electronic health record data elements for clinical trial feasibility. *Trials* 2014;15:18
- 19 Burke HB, Sessums LL, Hoang A, et al. Electronic health records improve clinical note quality. *J Am Med Inform Assoc* 2015;22(1): 199–205
- 20 Kurtzman JH, Wasserman EB, Suter BJ, Glantz JC, Dozier AM. Measuring adequacy of prenatal care: does missing visit information matter? *Birth* 2014;41(3):254–261
- 21 National Academy of Science. Institute of Medicine. Key capabilities of an electronic health record system: letter report. Washington (DC): National Academies Press; 2003
- 22 Blumenthal D, Glaser JP. Information technology comes to medicine. *N Engl J Med* 2007;356(24):2527–2534