Comparação entre viscosuplementação e plasma rico em plaquetas em lesões condrais de joelhos de pacientes jovens*

Platelet-Rich Plasma Versus Hyaluronic Acid for Knee Chondral Injuries In Young Patients

Marcus Vinicius Danieli^{1,2} João Paulo Fernandes Guerreiro^{1,2} Telvio Ataíde Vimercati¹
 Pedro Henrique Favaro Mendes² Paulo Raphael Tsutomu Katayama Miyazaki²
 Daniele Cristina Cataneo³

¹ Grupo de Cirurgia do Joelho, Uniorte Hospital de Ortopedia, Londrina, PR, Brasil

² Hospital Evangélico de Londrina, Londrina, PR, Brasil

³ Departamento de Cirurgia, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina, Botucatu, Botucatu, SP, Brasil

Endereço para correspondência Marcus Vinicius Danieli, PhD, Uniorte Hospital de Ortopedia, Av. Higienópolis, 2600, Londrina, PR, 86050-000, Brasil (e-mail: mvdanieli@hotmail.com).

Rev Bras Ortop 2021;56(5):634–640.

Resumo

Objetivo Comparar o resultado clínico e funcional da aplicação de ácido hialurônico (AH) ou plasma rico em plaquetas (PRP) no tratamento de pacientes jovens portadores de lesões condrais em joelhos, sem artrose.

Métodos Avaliação clínica e funcional prospectiva de 30 pacientes adultos jovens, com lesão condral no joelho, submetidos a tratamento conservador, com aplicação de AH ou PRP, com seguimento mínimo de 12 meses. Para avaliação, foi utilizado o *Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index* (WOMAC) e a escala visual analógica (EVA) da dor.

Resultados Avaliado pelo questionário de WOMAC, o grupo PRP mostrou melhora em todos os pontos de avaliação com significância estatística, já o grupo AH não mostrou melhora nos escores. Com relação à EVA, o PRP também mostrou melhora em todos os pontos de avaliação, e o grupo AH mostrou melhora com 6 e 12 meses. Quando comparados, o grupo PRP foi melhor que o grupo AH em todos os pontos de avaliação, de acordo com a escala de WOMAC, e até 6 meses nos resultados da EVA.

Conclusão O PRP obteve melhor resultado clínico e funcional quando aplicado em joelhos com lesões condrais de pacientes jovens, sem artrose, avaliado pelo questionário de WOMAC e pela EVA. Este resultado se manteve até 12 meses.

Nível de evidência Ensaio clínico randomizado (Tipo 2B)

Palavras-chave

- ▶ ácido hialurônico
- ▶ cartilagem articular
- ▶ joelho
- ▶ plasma rico em plaquetas
- ▶ viscosuplementação

* Trabalho desenvolvido no Grupo de Cirurgia do Joelho, Uniorte Hospital de Ortopedia, Londrina, PR, Brasil.

recebido

13 de Abril de 2020

aceito

17 de Setembro de 2020

Publicado on-line

Abril 19, 2021

DOI <https://doi.org/10.1055/s-0041-1724075>

ISSN 0102-3616.

© 2021. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. All rights reserved.

This is an open access article published by Thieme under the terms of the Creative Commons Attribution-NonDerivative-NonCommercial-License, permitting copying and reproduction so long as the original work is given appropriate credit. Contents may not be used for commercial purposes, or adapted, remixed, transformed or built upon. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

Thieme Revinter Publicações Ltda., Rua do Matoso 170, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20270-135, Brazil

Abstract

Objective The present study aimed to compare the clinical and functional outcomes of hyaluronic acid (HA) or platelet-rich plasma (PRP) applications to treat young patients with knee chondral lesions with no arthrosis.

Methods Prospective clinical and functional evaluation of 30 young adult patients with knee chondral lesions submitted to conservative treatment with HA or PRP for a minimum follow-up time of 12 months. The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC) and visual analog scale (VAS) were used for the evaluation.

Results According to the WOMAC score, the PRP group showed significant improvement in all evaluated points, whereas the HA group presented no score improvement. In the VAS, the PRP group showed improvement in all evaluated points, and the HA group presented improvement at 6 and 12 months. Compared to the HA group, the PRP group presented better WOMAC scores at all evaluated points and better VAS scores up to 6 months after treatment.

Conclusion Platelet-rich plasma application resulted in better clinical and functional outcomes at both the WOMAC and VAS scores when applied to knees from young patients with chondral lesions, but no arthrosis. These outcomes were sustained for up to 12 months.

Level of evidence Randomized clinical trial (Type 2B)

Keywords

- hyaluronic acid
- cartilage, articular
- knee
- platelet-rich plasma
- visco-supplementation

Introduo

O tratamento de leses da cartilagem articular tem sido desafiador para a rea ortopdica. Com uma estrutura complexa e bem organizada, o tecido condral tem limitado potencial intrnseco de cicatrizao. Leses por trauma ou por patologias degenerativas frequentemente resultam em deteriorao tecidual progressiva, levando dor articular incapacitante e osteoartrose.¹

As leses condrais so comuns no joelho e, em sua maioria, apresentam-se assintomticas. Widuchowski et al.² demonstraram que leses condrais podem estar presentes em at 63% das artroscopias de joelho e classificou 67% destas como leses focais. Prakash et al.³ afirmaram que mesmo essas leses focais podem progredir para osteoartrose. Quando sintomticas, apresentam um amplo espectro de sintomas, variando de somente crepitao espordica at grande limitao funcional, com dor, derrame articular e incapacidade para atividades bsicas do cotidiano.

Diante disso, surge interesse em alternativas conservadoras menos complexas e de menor custo que procedimentos cirrgicos, como infiltraes articulares com cido hialurnico (AH) e plasma rico em plaquetas (PRP).

O PRP uma soluo resultante da coleta do sangue, processamento e extrao do concentrado de plaquetas que tem sido usado em diversas patologias musculoesquelticas, e sua natureza autloga apresenta a vantagem de no oferecer reao imunolgica, quando usando o sangue do prprio paciente.

O PRP tem mostrado capacidade de estimular a produo de tecido condral, por meio de fatores de crescimento, e fornece suporte para conexes entre os condrcitos.⁴ Alm disso, o PRP age reduzindo a ao pr-inflamatria da interleucina-1, que reconhecida por ser uma das molculas

que induzem os condrcitos e clulas sinoviais a produzirem enzimas que degradam a matriz extracelular e aceleram a degenerao na osteoartrose.^{5,6} Outro efeito por meio de fatores de crescimento presentes nas plaquetas, como o *transforming growth factor beta* (TGF-),^{7,8} com ao condrognica sobre os condrcitos, inibindo a apoptose dessas clulas e induzindo a produo de colgeno.^{9,10}

J o cido hialurnico (AH) um componente bsico da cartilagem articular e do lquido sinovial. composto de repetidas sequncias de cido glicurnico e N-acetilglicosamina. Os sinovicitos tipo B sintetizam e secretam AH, que tem entre suas funes: promover proliferao e diferenciao de condrcitos¹¹ e regular, inibindo, citocinas pr-inflamatrias, como a interleucina 8 (IL-8) e a *transforming growth factor alpha* (TNF-).¹² Como agente farmacolgico, o AH j mostrou ter efeito anablico, anti-inflamatrio e antinociceptivo sobre o tecido condral.¹³ A molcula de AH tm tambm alta capacidade viscoelstica, higrscpica e de biocompatibilidade. Diante dessas propriedades, o AH funciona como um timo lubrificante, absorvedor de impacto, e age no balano hdrico, regulando fludos.¹⁴

Portanto, vislumbrando alm das tradicionais opes de tratamento conservador e cirrgico, este estudo busca avaliar a eficcia clnica e funcional das infiltraes de PRP e de AH em leses condrais, uma vez que h poucas pesquisas relacionadas ao uso destes em pacientes jovens com estas leses em estgio de pr-artrose.

Materiais e mtodos

O presente estudo foi aprovado pelo Comit de tica e Pesquisa (CAAE:58459816.5.0000.0099), e todos os indivduos selecionados concordaram em participar por meio da assinatura de

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Assim, foi realizado um estudo longitudinal prospectivo, em que foram acompanhados 30 pacientes com lesões de cartilagem diagnosticadas por meio de ressonância nuclear magnética (RNM) e classificadas pela *International Cartilage Repair Society* (ICRS).

Os critérios de inclusão para o estudo foram pacientes com lesão condral em joelho, até o grau III da classificação da ICRS, entre 18 e 50 anos de idade, com proposta de tratamento conservador que incluía viscosuplementação ou infiltração intra-articular de PRP. A distribuição dos pacientes entre os dois grupos foi feita de forma aleatória, por meio de sorteio. Todos os pacientes tentaram, antes das aplicações, no mínimo 3 meses de tratamento conservador com fisioterapia e medicação analgésica sem sucesso.

Os critérios de exclusão foram pacientes com idade superior a 50 ou abaixo de 18 anos, presença de artrose (classificação de Kellgren & Lawrence acima de II no exame radiográfico), índice de massa corpórea (IMC) ≥ 30 ou pacientes que não aceitaram participar do estudo.¹⁴ Os pacientes não poderiam ter usado anti-inflamatórios não esteroidais por 3 semanas antes das aplicações.

O grupo PRP foi formado por 15 pacientes, submetidos à aplicação intra-articular de PRP. A coleta do sangue do paciente foi feita sempre no dia de cada infiltração.

O PRP foi colhido e preparado de maneira estéril, seguindo os critérios exigidos para manipulação de derivados do sangue, ambulatorialmente, por uma bioquímica experiente na técnica. Uma veia periférica foi puncionada e foi feita a coleta de 20 ml de sangue em tubos estéreis de coleta a vácuo de 5 ml com 10% de citrato de sódio. Os tubos foram, então, centrifugados a 1.200 RPM por 10 minutos à temperatura ambiente, em uma centrífuga com 6,5 cm de raio, da marca Fanem® (Guarulhos, São Paulo, SP, Brasil). O resultado dessa centrifugação é composto por três camadas: células vermelhas (fundo do tubo), células brancas (fina camada sobre as hemácias, chamada de *buffy coat*) e plasma (camada mais superficial). O plasma era, a seguir, transferido para outro tubo de ensaio estéril de 10 ml, sem o *buffy coat*, sendo submetido a nova centrifugação por 5 minutos na mesma velocidade de rotação da primeira. O resultado desta segunda centrifugação são duas camadas, sendo a metade superior plasma pobre em plaquetas e a metade inferior, o PRP ou também chamado de concentrado de plaquetas. Este PRP (pobre em leucócitos) extraído foi aplicado de maneira intra-articular, uma vez por semana, durante 3 semanas consecutivas. A dose obtida para cada aplicação foi de 2,5 ml.

Já o grupo AH foi composto por 15 pacientes submetidos à viscosuplementação com AH. A injeção era feita uma vez por semana, durante 3 semanas consecutivas, com o produto de nome comercial SupraHyal Duo 2,5 mg/2,5 ml (Tedec-Meiji Farma S.A.; Madri, Espanha – importado por Zodiac Produtos Farmacêuticos S/A).

Os pacientes foram avaliados por meio da aplicação do questionário *Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index* (WOMAC) e da escala visual analógica (EAV) da dor. Os questionários eram aplicados 5 vezes em cada paciente, considerando os seguintes tempos: antes da 1ª infiltração, no dia da 3ª infiltração e no 3º, 6º e 12º mês a partir do início do tratamento.

Para as comparações estatísticas, foi proposto o modelo de regressão linear com efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos). Os modelos lineares de efeitos mistos são utilizados na análise de dados em que as respostas estão agrupadas (mais de uma medida para um mesmo indivíduo) e a suposição de independência entre as observações num mesmo grupo não é adequada. Para as comparações, foi utilizado o pós-teste por contrastes ortogonais. As análises foram realizadas por meio do software SAS 9.2 (SAS Institute, Cary, NC, EUA). Para todas as comparações adotou-se o nível de significância de 5%.

O fluxograma do estudo está representado na ►Figura 1.

Resultados

Entre os 15 pacientes inicialmente submetidos à infiltração de PRP, um paciente optou por descontinuar o tratamento após a primeira dose, devido a dor intensa e derrame articular no joelho. O quadro se desenvolveu nas primeiras 24 horas após o procedimento e teve resolução total em 3 dias. Esse paciente foi excluído do trabalho, deixando o grupo PRP com 14 pacientes. Sintomas semelhantes ocorreram em outros 2 pacientes deste grupo, que optaram por continuar no estudo e realizar as duas infiltrações seguintes, após as quais não houve recidiva da dor.

Quanto à constituição, o grupo PRP possuía 11 homens e 3 mulheres e teve média de idade de 34,93 anos (com idade mínima de 18 anos e máxima de 50 anos). Já o grupo AH foi composto por 11 pacientes do sexo masculino e 4 do sexo feminino, sendo a média de idade 36,47 anos (com idade mínima de 22 anos e máxima de 50 anos). Com relação a lateralidade, idade e sexo, os grupos foram homogêneos estatisticamente (►Tabela 1).

Com relação aos resultados do questionário WOMAC, os escores médios, desvio padrão, mediana, valores mínimos e máximos dos grupos são apresentados na ►Tabela 2. O grupo PRP mostrou melhora dos escores, com significância estatística em todos os pontos de avaliação quando comparados a antes do tratamento. O grupo AH não mostrou melhor resultado em nenhum momento neste quesito. Quando comparados os tratamentos, o grupo PRP foi melhor em todos os pontos de avaliação do que o grupo AH (►Tabelas 2 e 3).

Quanto aos resultados da EVA, os escores médios, desvio padrão, mediana, valores mínimos e máximos dos grupos são apresentados na ►Tabela 4. O grupo PRP, também nesta variável, mostrou melhora em todos os pontos de avaliação. Já o grupo AH mostrou melhora com 6 e 12 meses apenas. Na comparação entre grupos, o PRP teve melhor resultado neste quesito no pós-aplicação, com 3 e 6 meses (►Tabelas 4 e 5).

Discussão

O PRP tem sido usado para tratamento de artrose com bons resultados.^{15–20} Esses efeitos são ainda melhores quanto menor a idade dos pacientes e mais leve o acometimento articular.^{17,21–23} Porém ainda não havia estudo avaliando a aplicação para lesões condrais focais sem artrose no joelho.

Em uma meta-análise recente, Chen et al.²⁴ concluíram que o PRP proporciona maior alívio da dor e melhora

Fig. 1 Fluxograma do estudo.

Tabela 1 Perfil dos pacientes distribuídos entre os grupos

GRUPO	AH	PRP
N	15	14
Média de idade (mínimo e máximo)	36,47 (22-50)	34,93 (18-50)
Sexo F	4	3
Sexo M	11	11
Lado D	7	3
Lado E	3	8
Bilateral	5	4

Abreviaturas: AH, ácido hialurônico; D: direito; E: esquerdo; F: feminino; M: masculino; PRP, plasma rico em plaquetas.

funcional, no período de 12 meses, quando comparado ao AH e ao placebo em pacientes com osteoartrose de joelho. Esse estudo também indica que não há diferença quanto ao risco de efeitos adversos entre os métodos. Contudo, o autor

destacou a heterogeneidade tanto na preparação do PRP, quanto à gravidade da artrose. Nossos resultados foram semelhantes; no entanto, a novidade foi o uso em pacientes sem artrose e jovens, ampliando as opções de uso desta terapia.

Ainda não se sabe a melhor dose para o PRP, mas estudos sugerem que quanto mais repetições das aplicações, melhor o resultado funcional.^{15,19,21} Em nosso estudo, optamos por 3 aplicações, para ser igual à dose sugerida do produto que usamos na viscosuplementação. Também não se sabe qual concentração de plaquetas seria melhor, discutindo-se até que, na verdade, teríamos que avaliar e quantificar o melhor fator de crescimento ou citocina presente no PRP para cada tecido alvo.^{18,19,25,26}

Os leucócitos podem causar efeitos adversos, tais como artrite reacional, além de poder estimular o catabolismo condral.^{23,27} Por isso, optamos, em nosso estudo, pelo uso de PRP pobre em leucócitos, o que pode ter influenciado nos resultados a favor do PRP.

Tabela 2 Valores do questionário WOMAC para os grupos (média, desvio padrão, mediana, valores mínimos e máximos)

WOMAC						
GRUPO	Tempo	Média	Desvio padrão	Mínimo	Mediana	Máximo
PRP	Pré	34,78	16,99	1	37,5	61
	Pós	20,56	13,56	1	17,0	50
	3 m	16,94	10,32	1	13,5	45
	6 m	16,39	10,81	1	14,5	40
	12 m	19,33	13,86	1	16,0	48
AH	Pré	23,95	17,48	2	20,5	62
	Pós	21,35	21,18	1	15,0	79
	3 m	24,45	25,96	2	14,5	85
	6 m	21,80	19,69	1	13,5	63
	12 m	25,80	19,68	2	21,5	63

Abreviaturas: AH, ácido hialurônico; WOMAC, *Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index*.

Tabela 3 Comparação entre os grupos e tempos dos resultados do questionário de WOMAC

Comparações	Estimativa	Valor de P
PRP (pré e pós)	14,22	< 0,01
PRP (pré e 3 meses)	17,83	< 0,01
PRP (pré e 6 meses)	18,39	< 0,01
PRP (pré e 12 meses)	15,44	< 0,01
AH (pré e pós)	2,6	0,34
AH (pré e 3 meses)	-0,5	0,85
AH (pré e 6 meses)	2,15	0,43
AH (pré e 12 meses)	-1,85	0,50
Pós (PRP x AH)	15,70	< 0,01
3 meses (PRP x AH)	16,27	< 0,01
6 meses (PRP x AH)	16,67	< 0,01
12 meses (PRP x AH)	17,72	< 0,01

Abreviaturas: AH, ácido hialurônico; PRP, plasma rico em plaquetas; WOMAC, *Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index*.

Han et al.,²⁸ em sua meta-análise, encontraram resultados similares nas avaliações de WOMAC, EAV e IKDC para PRP e AH, no período entre o 1° e o 3° mês após as infiltrações. Entretanto, entre o 6° e 12° mês de acompanhamento após infiltração, somente o PRP foi capaz de sustentar a melhora funcional e da dor ocorrida nos primeiros meses. Esses autores ainda destacaram não haver diferença para efeitos adversos entre as duas opções terapêuticas e ressaltou que o PRP tem seus melhores resultados em casos de artrose leve ou moderada.

Di et al.,²⁹ em revisão sistemática, mostraram que o PRP teria maior capacidade de melhorar o WOMAC por um período mínimo de 24 semanas. Contudo, o mesmo estudo analisou outras mensurações de dor, como IKDC e EVA, e não encontrou diferença estatística em comparação aos grupos submetidos à viscosuplementação. Tavassoli et al.³⁰ destacou que, quando comparado a 3 infiltrações de AH por 3 semanas seguidas, somente o PRP foi capaz de melhorar em mais de 30% os valores de WOMAC. Essa melhora foi significativamente maior quando feitas duas doses de PRP com

Tabela 4 Valores da EVA para os grupos (média, desvio padrão, mediana, valores mínimos e máximos)

ESCALA DE DOR						
GRUPO	Tempo	Média	Desvio padrão	Mínimo	Mediana	Máximo
PRP	Pré	6,06	2,62	0	6,0	10
	Pós	4,50	2,36	0	5,0	8
	3 m	4,50	2,36	0	5,0	8
	6 m	3,67	2,11	0	4,5	7
	12 m	4,06	1,76	1	4,5	6
AH	Pré	5,95	2,58	0	6,0	10
	Pós	5,20	3,12	0	5,5	10
	3 m	5,20	3,40	0	5,0	10
	6 m	4,85	2,96	0	5,0	10
	12 m	4,50	2,31	1	5,0	8

Abreviaturas: AH, ácido hialurônico; EVA, escala visual analógica; PRP, plasma rico em plaquetas.

Tabela 5 Comparao entre os grupos e tempos dos resultados da EVA

Compara��es	Estimativa	Valor de P
PRP (pr� e p�s)	1,56	< 0,01
PRP (pr� e 3 meses)	1,56	< 0,01
PRP (pr� e 6 meses)	2,39	< 0,01
PRP (pr� e 12 meses)	2,00	< 0,01
AH (pr� e p�s)	0,75	0,09
AH (pr� e 3 meses)	0,75	0,09
AH (pr� e 6 meses)	1,10	0,01
AH (pr� e 12 meses)	1,45	< 0,01
P�s (PRP x AH)	2,12	< 0,01
3 meses (PRP x AH)	2,12	< 0,01
6 meses (PRP x AH)	1,98	0,02
12 meses (PRP x AH)	1,24	0,14

Abreviaturas: AH, cido hialurnico; EVA, escala visual analgica; PRP, plasma rico em plaquetas.

intervalo de 3 semanas, em comparao ao grupo em que foi feita somente uma dose.

Apesar de o uso clnico rotineiro do PRP intra-articular ainda no ser uma realidade no Brasil, sendo liberada sua aplicao apenas em pesquisas, no presente estudo esse mtodo se mostrou eficaz em pacientes jovens com leses condrais de joelho, ao reduzir as limitaes de atividades dirias – avaliado por meio do questionrio de WOMAC, e tambm ao diminuir a dor global do paciente – medida pela EVA.

Por outro lado, o AH mostrou melhora apenas aps 6 meses da aplicao, durando at 12 meses quando avaliado pela EVA, e menor consistncia de resultados quanto ao WOMAC. H de se destacar ainda que tanto o PRP quanto o AH possuem variao quanto sua frmula, com divergentes formas de preparao e concentraes de plaquetas no primeiro mtodo e, principalmente, os diferentes pesos moleculares entre as solues comercializadas para viscosuplementao.

Como limitaes deste estudo, podemos citar o nmero limitado de pacientes. Essa limitao se deu pela dificuldade do uso do PRP em nosso meio, devido a restries legais, e pela limitao do uso da viscosuplementao, devido a custos. A ausncia de grupo controle ou *sham* tambm pode ser uma fonte de vis. A ausncia de cegamento pode ser citada como limitao, tendo sido optada para evitar retirada de sangue do paciente randomizado para o grupo AH.

Portanto, alm das medidas conservadoras, como educao do paciente quanto sua leso e limitaes, orientaes de atividade fsica para fortalecimento muscular, perda ponderal, uso de analgsicos e anti-inflamatrios, deve-se considerar ambos os mtodos para o tratamento de leses condrais de joelho em pacientes jovens. Ressalta-se, contudo, a necessidade de mais estudos em pacientes com esse perfil de leso para melhor embasamento cientfico.

Concluso

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que o PRP obteve melhor resultado clnico e funcional quando aplicado em joelhos de pacientes jovens com leses condrais, sem artrose, avaliado pelo questionrio de WOMAC e EVA. Este resultado se manteve at 12 meses.

Suporte Financeiro

No houve suporte financeiro de fontes pblicas, comerciais, ou sem fins lucrativos.

Conflito de interesses

Os autores declaram inexistncia de conflito de interesses na realizao deste trabalho.

Referncias

- Lories RJ, Luyten FP. The bone-cartilage unit in osteoarthritis. *Nat Rev Rheumatol* 2011;7(01):43–49
- Widuchowski W, Widuchowski J, Trzaska T. Articular cartilage defects: study of 25,124 knee arthroscopies. *Knee* 2007;14(03):177–182
- Prakash D, Learmonth D. Natural progression of osteo-chondral defect in the femoral condyle. *Knee* 2002;9(01):7–10
- Snchez M, Anitua E, Orive G, Mujika I, Andia I. Platelet-rich therapies in the treatment of orthopaedic sport injuries. *Sports Med* 2009;39(05):345–354
- van Buul GM, Koevoet WLM, Kops N, et al. Platelet-rich plasma releasate inhibits inflammatory processes in osteoarthritic chondrocytes. *Am J Sports Med* 2011;39(11):2362–2370
- Sundman EA, Cole BJ, Karas V, et al. The anti-inflammatory and matrix restorative mechanisms of platelet-rich plasma in osteoarthritis. *Am J Sports Med* 2014;42(01):35–41
- Snchez M, Anitua E, Azofra J, Aguirre JJ, Andia I. Intra-articular injection of an autologous preparation rich in growth factors for the treatment of knee OA: a retrospective cohort study. *Clin Exp Rheumatol* 2008;26(05):910–913
- Lubkowska A, Dolegowska B, Banfi G. Growth factor content in PRP and their applicability in medicine. *J Biol Regul Homeost Agents* 2012;26(02 Suppl 1):3S–22S
- Pavlovic V, Ciric M, Jovanovic V, Stojanovic P. Platelet Rich Plasma: a short overview of certain bioactive components. *Open Med (Wars)* 2016;11(01):242–247
- Parrish WR, Roides B. Platelet rich plasma in osteoarthritis: more than a growth factor therapy. *Musculoskelet Regen* 2017;3:e1518
- Kawasaki K, Ochi M, Uchio Y, Adachi N, Matsusaki M. Hyaluronic acid enhances proliferation and chondroitin sulfate synthesis in cultured chondrocytes embedded in collagen gels. *J Cell Physiol* 1999;179(02):142–148
- Wang CT, Lin YT, Chiang BL, Lin YH, Hou SM. High molecular weight hyaluronic acid down-regulates the gene expression of osteoarthritis-associated cytokines and enzymes in fibroblast-like synoviocytes from patients with early osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage* 2006;14(12):1237–1247
- Ghosh P. Osteoarthritis and hyaluronan–palliative or disease-modifying treatment? *Semin Arthritis Rheum* 1993;22(06 Suppl 1):1–3
- Laurent TC, Laurent UBG, Fraser JRE. The structure and function of hyaluronan: An overview. *Immunol Cell Biol* 1996;74(02):A1–A7
- Kavadar G, Demircioglu DT, Celik MY, Emre TY. Effectiveness of platelet-rich plasma in the treatment of moderate knee osteoarthritis: a randomized prospective study. *J Phys Ther Sci* 2015;27(12):3863–3867

- 16 Meheux CJ, McCulloch PC, Lintner DM, Varner KE, Harris JD. Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. *Arthroscopy* 2016;32(03):495–505
- 17 Kanchanatawan W, Arirachakaran A, Chaijenkij K, et al. Short-term outcomes of platelet-rich plasma injection for treatment of osteoarthritis of the knee. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2016;24(05):1665–1677
- 18 Dai WL, Zhou AG, Zhang H, Zhang J. Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Arthroscopy* 2017;33(03):659–670.e1
- 19 Milano G, Sánchez M, Jo CH, Saccomanno MF, Thampatty B, Wang JH. Platelet-rich plasma in orthopaedic sports medicine: state of the art. *J ISAKOS* 2019;4:188–195
- 20 Louis ML, Magalon J, Jouve E, et al. Growth Factors Levels Determine Efficacy of Platelets Rich Plasma Injection in Knee Osteoarthritis: A Randomized Double Blind Noninferiority Trial Compared With Viscosupplementation. *Arthroscopy* 2018;34(05):1530–1540.e2
- 21 Görmeli G, Görmeli CA, Ataoglu B, Çolak C, Aslantürk O, Ertem K. Multiple PRP injections are more effective than single injections and hyaluronic acid in knees with early osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2017;25(03):958–965
- 22 Mascarenhas R, Saltzman BM, Fortier LA, Cole BJ. Role of platelet-rich plasma in articular cartilage injury and disease. *J Knee Surg* 2015;28(01):3–10
- 23 Levy DM, Petersen KA, Scalley Vaught M, Christian DR, Cole BJ. Injections for Knee Osteoarthritis: Corticosteroids, Viscosupplementation, Platelet-Rich Plasma, and Autologous Stem Cells. *Arthroscopy* 2018;34(05):1730–1743
- 24 Chen P, Huang L, Ma Y, et al. Intra-articular platelet-rich plasma injection for knee osteoarthritis: a summary of meta-analyses. *J Orthop Surg Res* 2019;14(01):385
- 25 Oh JH, Kim W, Park KU, Roh YH. Comparison of the Cellular Composition and Cytokine-Release Kinetics of Various Platelet-Rich Plasma Preparations. *Am J Sports Med* 2015;43(12):3062–3070
- 26 Ha CW, Park YB, Jang JW, Kim M, Kim JA, Park YG. Variability of the Composition of Growth Factors and Cytokines in Platelet-Rich Plasma From the Knee With Osteoarthritis. *Arthroscopy* 2019;35(10):2878–2884.e1
- 27 Riboh JC, Saltzman BM, Yanke AB, Fortier L, Cole BJ. Effect of Leukocyte Concentration on the Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis. *Am J Sports Med* 2016;44(03):792–800
- 28 Han Y, Huang H, Pan J, et al. Meta-analysis Comparing Platelet-Rich Plasma vs Hyaluronic Acid Injection in Patients with Knee Osteoarthritis. *Pain Med* 2019;20(07):1418–1429
- 29 Di Y, Han C, Zhao L, Ren Y. Is local platelet-rich plasma injection clinically superior to hyaluronic acid for treatment of knee osteoarthritis? A systematic review of randomized controlled trials. *Arthritis Res Ther* 2018;20(01):128
- 30 Tavassoli M, Janmohammadi N, Hosseini A, Khafri S, Esmaeilnejad-Ganji SM. Single- and double-dose of platelet-rich plasma versus hyaluronic acid for treatment of knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. *World J Orthop* 2019;10(09):310–326