Eisenmangelanämie in Schwangerschaft und Wochenbett

Dr. Pia Ruisinger, Gynäkologin; Prof. Dr. Franz Kainer, Gynäkologe, Nürnberg

Der Eisenbedarf steigt während der Schwangerschaft physiologisch an und kann unter Umständen weder durch Diät noch aus den Eisenspeichern des Körpers gedeckt werden. Der daraus resultierende Eisenmangel ist die häufigste Ursache für eine Anämie in der Schwangerschaft und post partum. Diese ist mit einer erhöhten maternalen und fetalen Morbidität und Mortalität verbunden.

Häufigkeit und Ursache der Eisenmangelanämie

Die Anämie (Blutarmut) ist ein häufiges Erscheinungsbild in der Schwangerschaft. Physiologisch kommt es zu einer **Verminderung des Hämoglobins** um 2–4 g/dl aufgrund einer Hämodilution (stärkere Zunahme des Plasmavolumens bis zur 24. SSW als ebenfalls gesteigerte Erythrozytenmasse). Darüber hinaus entsteht eine Anämie durch eine **verminderte Hämoglobinsynthese** (z.B. Eisenmangel, Fehl-/Mangelernährung, chronische/akute Entzündungen), einen **vermehrten Abbau** (Hämolyse z.B. durch: Präeklampsie/HELLP, Hämoglobinopathien wie Sichelzellanämie, Infektionen) oder einen **verstärkten Verlust** (Blutung z.B. durch Hypermenorrhoe präkonzeptionell, akute Blutung bei Plazenta previa etc.).

Die häufigste Ursache einer Anämie in der Schwangerschaft ist ein **Eisenmangel**, der mit einer Prävalenz weltweit von 20–80% bei Frauen im gebärfähigen Alter vorliegt [1]. In Mitteleuropa geht man bei graviden Frauen von einer Prävalenz von 10–15% und in Entwicklungsländern von 50–75% aus [2].

Risikofaktoren für einen Eisenmangel sind:

- erhöhter Eisenbedarf (Schwangerschaft, Wachstumsalter) (Tab. 1)

- sozioökonomische Faktoren (niedriger Sozialstatus, Migrantinnen, junge Schwangere)
- Ernährungsgewohnheiten (Fehlernährung, Alkoholismus)
- chronische Blutverluste (Hypermenorrhoe, gastrointestinale Blutung)
- rasche Schwangerschaftsfolge
- Eisenmangelanämie in vorangehender Schwangerschaft
- chronische Darmerkrankungen/ Malabsorptionssyndrom [3]

Die Ursache einer Anämie ist – trotz der Dominanz des Eisenmangels – multifaktoriell bedingt. Das Symptom Blutarmut bedarf über die einfache Hämoglobinbestimmung hinaus einer differenzierten anamnestischen und labordiagnostischen Abklärung (s.u.).

Basisinformation zum Eisenmetabolismus

Der tägliche Eisenbedarf in der Schwangerschaft ist mit 30 mg etwa doppelt so hoch wie der Eisenbedarf einer nicht schwangeren Frau zwischen 19 und 50 Jahren mit 15 mg. Bei einer Ernährung mit ausgewogener Mischkost werden täglich 15–20 mg Eisen aufgenommen, überwiegend in Form von Fleisch und Wurstwaren, jedoch werden davon nur 1 mg bis maximal 3 mg Eisen vom Darm

resorbiert. Der Eisenbedarf in der Frühschwangerschaft liegt bei 4–6 mg/d, in der Spätschwangerschaft bei 6–7 mg/d. Somit entsteht also ein Defizit von etwa 3 mg Eisen pro Tag, was zu einer Entleerung der Eisenspeicher führt [5].

Nach der Resorption im Darm wird das Eisen für den Transport an das Protein Transferrin gebunden, und über den Transferrinrezeptor von unreifen Erythrozyten aufgenommen. Hier wird 75% des Eisens zur Synthese des eisenhaltigen Proteinkomplexes Hämoglobin benötigt, welches den Sauerstoff an die Erythrozyten bindet. Da Eisen in freier Form die Zelle schädigt, liegt das restliche Eisen in seiner Speicherform Ferritin in Knochenmark, Leber und Milz vor oder dient der Enzymproduktion [6] (Abb. 1).

Symptome und Risiken

Eine Anämie wird meist aufgrund der Routinebestimmung des Hämoglobingehalts im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge diagnostiziert und ist zu dem Zeitpunkt häufig klinisch symptomlos.

Durch den erhöhten Eisenbedarf in der Schwangerschaft, der weder durch Diät noch aus den Eisenspeichern des Körpers gedeckt werden kann, kommt es u. a. zu

Tab. 1 Negative Eisenbilanz in der Schwangerschaft [4].

Fetus	270 mg
Plazenta	90 mg
Zunahme der Erythrozyten	450 mg
Geburt (Blutung)	150 mg
Nettoverlust von bis zu	1000 mg

einer Beeinträchtigung der Synthese von Hämoglobin und somit zur Verminderung der Sauerstofftransportkapazität eines Erythrozyten. Da ein Erythrozyt eine Lebensdauer von etwa 120 Tagen hat, müssen folglich in Schwangerschaft und Wochenbett Erythrozyten neu gebildet werden, die jedoch durch den Substratmangel Eisen einen geringeren Hämoglobingehalt haben. Somit kommt es zur **Minderversorgung der Peripherie mit Sauerstoff** und kompensatorisch zur **Hyperventilation** und **Hyperzirkulation**.

Die sich daraus ergebenden Symptome sind allerdings meist unspezifisch und korrelieren nicht mit dem Schweregrad der Anämie.

Klinische Symptome:

- Reduzierte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
- Schwindel, Kopfschmerzen, Ohrensausen
- Belastungs- und Ruhedyspnoe
- Herzklopfen, Tachykardie, weite Blutdruckamplitude, funktionelle Herzgeräusche
- Restless-Legs-Syndrom
- blasse Haut und Schleimhaut [7]

Zusätzlich kommt es in Abhängigkeit vom Schweregrad der Anämie zu einer Zunahme von **Schwangerschaftskomplikationen**:

- Aborte
- Frühgeburten
- intrauterine Wachstumsretardierung

- intrauteriner Fruchttod
- maternale Harnwegsinfektionen [8]

Die Eisenmangelanämie korreliert außerdem bei Wöchnerinnen mit depressiven Verstimmungen und Stress. Diese Veränderungen können dazu führen, dass Mütter die Versorgung ihrer Säuglinge vernachlässigen und dadurch die Mutter-Kind-Beziehung gestört wird.

Diagnostik

Per definitionem ist eine Anämie eine **Verminderung der Hämoglobin-Konzentration (Hb) im Blut** unter die alters- und geschlechtsspezifische Norm. Für die Schwangerschaft ergeben sich nach WHO und CDC (Center of Disease Control) folgende Grenzwerte:

- Gynäkologie: Hb < 12 g/dl
- Schwangerschaft I./III. Trimenon: Hb < 11 g/dl

Abb. 1 Eisenstoffwechsel (eigene Darstellung).

- Schwangerschaft II. Trimenon:
Hb < 10,5 g/dl
- Post partum: Hb < 10 g/dl [9]

Bislang beschränkte sich die Diagnostik weitgehend auf die **Bestimmung des Hämoglobinwerts im Blut**. Dieser Wert kann jedoch keine Auskunft über den aktuellen Eisenstatus geben. Da ein Fließgleichgewicht zwischen dem Ferritin in den Zellen und im Serum besteht, erlaubt die **Ferritinbestimmung im Serum** eine Aussage über den Eisenbestand des Körpers.

Vier Befundgruppen sind bei der Ferritinbestimmung relevant [10]:

- < 15 µg/l: Eisenspeicher entleert
- 15–30 µg/l: knappe Eisenspeicher
- 30–50 µg/l: Grauzone
- > 50 µg/l: genügend Eisenspeicher

Bei Leberschäden, Tumorerkrankungen und aktiven Entzündungen kann der Wert jedoch auch unabhängig vom Speichereisen erhöht sein, da Serumferritin ein Akutphaseprotein ist.

Hier können der lösliche Transferrinrezeptor oder Erythrozytenindizes wie MCV (mittleres Zellvolumen eines Erythrozyten), MCHC (mittlere Hämoglobinkonzentration eines Erythrozyten) sowie

Retikulozytenzählung Aufschluss über einen Eisenmangel geben. Außerdem empfiehlt sich eine CRP-Bestimmung, um einen Eisenmangel bei entzündungsbedingt hohen Serumferritin-Werten ggf. zu demaskieren.

Prophylaxe und Therapie

Generell richtet sich die Therapie der Anämie nach deren Ursache und Schwere. Für die Auswahl der Therapieoption muss die **tolerierbare Zeitspanne für einen positiven Therapieeffekt** v.a. kurz vor Entbindung und bei schweren postpartalen Blutungen berücksichtigt werden.

Im Allgemeinen ist eine Anämie in der Schwangerschaft behandlungsbedürftig, wenn das Hämoglobin einen Wert von < 10,5 g/dl und das Serumferritin einen Wert von < 30 µg/l unterschreitet [10].

Durch eine **Diät mit eisenangereicherten Nahrungsmitteln** kann das Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels vermindert werden. Zur Therapie eines bestehenden Eisenmangels sind diese jedoch nicht ausreichend. Grund dafür ist die eingeschränkte Bioverfügbarkeit von

Eisen, welche von vier Faktoren bestimmt wird: die Wertigkeit des Eisens (zweiwertig oder dreiwertig), die Herkunft (tierisch, pflanzlich, mineralisch), die Löslichkeit und die Art der Bindung im Molekül (gebunden an Proteine, Gerbstoffe). In pflanzlichen Lebensmitteln liegt dreiwertiges Eisen vor und ist teilweise fest an bestimmte Kohlenhydrate gebunden, sodass es generell schlecht bioverfügbar ist. Es wären große Mengen nötig, um den täglichen Bedarf zu decken. In Fleisch, Fisch und Geflügel liegt zweiwertiges Eisen vorwiegend gebunden an Myo- und Hämoglobin (sogenanntes Hämeisen) vor, das durch einen speziellen Rezeptor an der Darmzelle vergleichsweise gut resorbiert werden kann [6] (Tab. 2).

Eine allgemeingültige Richtlinie der Fachgesellschaften zur Eisensubstitution in der Schwangerschaft existiert derzeit in Deutschland noch nicht. In der gängigen Literatur sind sich die Autoren jedoch einig, dass der erhöhte physiologische Eisenbedarf vor allem in der 2. Hälfte der Schwangerschaft nicht allein über die Nahrung gedeckt werden kann. Eine Eisensubstitution während der Schwangerschaft führt zu einer Erhöhung der Ferritin- und Hämoglobinkonzentration und somit zu einer Verminderung der Prävalenz der Eisenmangelanämie [10].

Ist die Diagnose einer Eisenmangelanämie in der Schwangerschaft anhand der Parameter Hämoglobin und Serumferritin gestellt, sollte anhand eines Stufenschemas die richtige Therapie gewählt werden.

Zur Auswahl stehen: orale Eisensubstitution, parenterale Eisengabe, Bluttransfusion (Tab. 3).

Orale Eisensubstitution

Bei bestehender Indikation ist die **Verabreichung von Eisen-II-Sulfat 1–2 × 80 mg/d oral** oder mit **Äquivalentpräparat** für die Dauer von 6 Wochen etwa 1–2

Tab. 2 Bioverfügbarkeit von Eisen in Lebensmitteln.

Nahrungsmittel	Zubereitung	Eisengehalt (mg/100g)	Bioverfügbarkeit
Tierische Nahrungsmittel, Hämeisen			
– Rindfleisch	roh, frisch	2,0 bis 4,3	hoch
– Schweinefleisch	roh, frisch	2,5 bis 5,0	hoch
– Geflügel	roh, frisch	1,5 bis 2,5	hoch
– Fisch	roh	0,5 bis 1,0	hoch
Tierische Nahrungsmittel, Nicht-Hämeisen			
– Leber	roh	6,0 bis 14,0	niedrig
– Ei	ganz, frisch	2,0 bis 3,0	niedrig
– Kuhmilch	Frisch, Vollmilch	0,1 bis 0,4	mittel
Pflanzliche Nahrungsmittel			
– Hülsenfrüchte	variabel	1,9 bis 14,0	niedrig
– Getreidemehl	Vollkorn	4,0	niedrig
– Getreidemehl	Weißmehl	1,5	niedrig
– Getrocknete Früchte	variabel	2,0 bis 10,6	niedrig
– grünes Blattgemüse	roh	0,4 bis 18,0	niedrig
– Wurzelpflanzen	roh	0,3 bis 2,0	niedrig
– Früchte	Konserven oder frisch	0,2 bis 4,0	niedrig

Stunden vor den Mahlzeiten Mittel der ersten Wahl [8]. Zusätzlich wird bei Verträglichkeit die Einnahme von Vitamin C empfohlen, um die enterale Eisenresorption zu optimieren. Eine weitere Dosissteigerung ist nicht zu empfehlen, da sie nicht zu einer höheren enteralen Resorption, jedoch zu häufigeren Nebenwirkungen führt. Diese sind v.a. gastrointestinale Symptome wie Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Sodbrennen, Obstipation, dunkler Stuhl, aber auch Durchfall und unspezifische Unverträglichkeitsreaktionen. Der Therapieerfolg kann anhand eines Retikulozytenanstiegs ab dem 4. Therapietag, einem Hämoglobinanstieg nach 10–14 Tagen oder dem Anstieg des Ferritinspiegels auf 50–80 µg/l bewertet werden [1].

Parenterale Eisensubstitution

Bei schlechter Verträglichkeit oder Erfolglosigkeit der oralen Therapie sowie

bei schwerer Eisenmangelanämie (Hb < 9 g/dl, Serumferritin < 12 µg/l) ist die **intravenöse Eisengabe** aufgrund ihrer deutlich höheren Effektivität zu bevorzugen. Die Dosierung muss individuell dem Gesamteisendefizit angepasst werden und errechnet sich nach der **Ganzoni-Formel**:

Eisendefizit (mg) = Körpergewicht (kg) × (Soll-Hb g/dl – Ist-Hb g/dl) × 2,4 + Reserveisen (500 mg)

So müssten zum Beispiel bei einer Patientin mit 70 kg Körpergewicht ca. 700 mg Eisen appliziert werden, um einen Hb-Anstieg von 1 g/dl zu erreichen.

Zur parenteralen Eisentherapie steht eine Reihe von intravenösen Präparaten zur Verfügung. Aufgrund des besten Nebenwirkungs-Wirkungs-Profils wird eine Therapie mit Fe(II)-hydroxid-Poly-maltose 100–1000 mg in 50–100 ml NaCl 0,9% als einmalige Kurzinfusion (max. Wochendosis 1000 mg) oder Eisensac-

Tab. 3 Stufenschema einer Eisenmangelanämie in der Schwangerschaft [10, 11].

Schwere der Anämie	Therapie
Hb < 10,5 g/dl und Serumferritin < 30 µg/l	Orale Eisengabe: Eisen-II-Sulfat (Tardyferon®) 160 mg/d
Hb < 9 g/dl und Serumferritin < 12 µg/l	Parenterale Eisengabe: Eisen-Polymaltose (Ferinject®) einmalig bis 1000 mg i.v. 1×/Woche oder Eisensaccharose (Venofer®) 200 mg i.v. 1–2×/Woche
Hb < 7 g/dl	Bluttransfusion

charose 200mg in 200ml NaCl 0,9% als Kurzinfusion 1–2×/Woche (max. Wochendosis 1600mg) empfohlen. Als Nebenwirkung kann es zu einer Flush-Reaktion und generalisierten Hauteffloreszenzen, zu Kopfschmerzen oder zu einem metallischen Mundgeschmack während der Kurzinfusion kommen [10].

Bluttransfusion

Eine **Transfusion von Erythrozytenkonzentraten** darf nur nach ausführlicher Aufklärung der Schwangeren über Notwendigkeit und Risiken der Transfusion und nach strenger Indikationsstellung durchgeführt werden. Eine Fremdblutgabe sollte möglichst unter Berücksichtigung der Patientenwünsche erfolgen, allerdings muss bei vitaler Indikation der Ernst der Situation unmissverständlich kommuniziert werden.

Die Bluttransfusion ist die sicherste Methode, eine Anämie zeitnah zu therapieren. Weist eine schwangere Patientin mit Anämie akute Blutvolumenmangelsymptome auf, besteht die Indikation zur Fremdbluttransfusion. Ebenso sollte bei hämodynamisch stabilen Schwangeren eine Fremdbluttransfusion spätestens ab einem Hb < 7 g/dl angeboten werden, bzw. ab einem Hb < 9 g/dl, falls geburts-hilfliche Blutungsrisiken vorhanden sind [11].

Anämie im Wochenbett

Eine **therapiepflichtige Anämie im Wochenbett** liegt bei Frauen mit einem Hb < 10 g/dl vor. Die Bestimmung des Hb-Wertes sollte 24–48 Stunden postpartum bei Blutverlusten > 500 ml peripartal erfolgen [11]. In der Regel handelt es sich hierbei um eine akute Blutungsanämie, welche durch einen vorbestehenden Eisenmangel weiter verstärkt wurde. Symptome der postpartalen Anämie können eine erhöhte kardiovaskuläre Belastung (orthostatische Beschwerden, Schwindel), eine verminderte Leistungsfähigkeit und schnelle

Ermüdung, sowie eine verzögerte Wundheilung und erhöhtes Infektionsrisiko sein.

Auch hier stehen die drei Varianten der Therapie – oral, parenteral, Transfusion – zur Verfügung (Tab. 4).

Eine orale Eisensubstitution ist oft nicht ausreichend, da die Eisenspeicher weitgehend entleert sind und gleichzeitig die Eisenresorption durch postpartale Entzündungsreaktionen vermindert wird. In diesen Fällen wird die parenterale Applikation von Eisen empfohlen. Die Gabe von Erythrozytenkonzentraten muss streng indiziert sein und sollte nur im Notfall oder bei schweren, klinisch symptomatischen Anämien erfolgen. Unabhängig vom Hämoglobinwert muss die Infusion von Plasmaexpandern und kristalloiden Lösungen zur Kreislaufstabilisierung großzügig appliziert werden.

Eine Anämiebehandlung mit Erythropoetin sollte nur im Rahmen wissenschaftlicher Studien durchgeführt werden [11].

Schwangerschaftsvorsorge

Im Rahmen der Mutterschaftsrichtlinien wird die Hb-Konzentration in der Schwangerschaft regelmäßig bestimmt und kann somit Aussage über das Vorliegen einer Anämie geben. Sie sagt jedoch nichts über die Kapazität der körpereigenen Eisenspeicher aus. Eine **Ferritinbestimmung** kann Aufschluss über eine ausreichende Füllung der Eisenspeicher geben, noch bevor sich eine Anämie manifestiert (Normbereich 50–80 µg/l).

Die Prophylaxe eines Eisenmangels und einer daraus resultierenden Eisenmangelanämie ist sinnvoll und effektiv [13].

Tab. 4 Stufenschema einer Anämie im Wochenbett [10].

Schwere der Anämie	Therapie
Hb < 10 g/dl	Orale Eisengabe: Eisen-II-Sulfat (Tardyferon®) 200 mg/d
Hb < 8 g/dl oder Serumferritin < 12 µg/l	Parenterale Eisengabe: Eisen-Polymaltose (Ferinject®) 1000 mg einmalig i.v. oder Eisensaccharose (Venofer®) 200 mg i.v. über 2–4 Tage
Schwere peripartale Blutverluste mit Symptomen des Volumenmangels	Bluttransfusion

Aufgrund der fehlenden Richtlinien der Fachgesellschaften zur Therapie und Prophylaxe der Eisenmangelanämie in Schwangerschaft und Wochenbett gibt es allerdings keine eindeutige Empfehlung zur Eisensubstitution.

Aus unserer Sicht ist eine generelle Eisenmangelprophylaxe mit 30–40 mg Eisen pro Tag bei allen Schwangeren ab der 10. SSW einer ferritinspiegelabhängigen Eisensubstitution vorzuziehen [11]. Von wesentlicher Bedeutung ist eine ausführliche Beratung der Patientin präkonzeptionell, in der Schwangerschaft, sowie im Wochenbett. Diese sollte individuell und abhängig von der jeweiligen medizinischen und sozialen Situation erfolgen.

Literatur

- 1 Breyman C et al. Semin Hematol 2015 Oct; 52 (4): 339–347. doi: 10.1053/j.seminhematol.2015.07.003. Epub 2015 Jul 10. Iron Deficiency Anemia in Pregnancy
- 2 Shrimpton R et al. Food Nutr Bull 2009 Dec; 30 (4 Suppl): 556–573. Multiple micronutrient supplementation during pregnancy in developing-country settings: policy and program implications of the results of a meta-analysis
- 3 Breyman C et al. Eur J Intern Med 2012 Sep; 23 (6): 529–533. doi: 10.1016/j.ejim.2012.04.008. Epub 2012 May 4. Anemia-prevalence and risk factors in pregnancy
- 4 Bothwell. Am J Clin Nutr 2000; 72 (suppl): 257S–264S
- 5 Scholl TO. Iron status during pregnancy: setting the stage for mother and infant. Am J Clin Nutr 2005; 81: 1218S–1222S
- 6 Bastigkeit M. Eisen – Neue Erkenntnisse verändern Therapie, GOVI-Verlag 2005
- 7 Schleußner E. Eisenmangel und Eisenmangelanämie in der gynäkologischen Praxis. Therapiecard Eisenmangelanämie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2013
- 8 Schaefer RM et al. Aktuelle Empfehlungen zur Therapie der Eisenmangelanämie – update 2005. Eisenbrief 2005; 3: 1–12. Verfügbar auf www.journal-med.de
- 9 Breyman C. Milk iron content in breast-feeding mothers after administration of intravenous iron sucrose complex. Perinat Med 2007; 35 (2): 115–118
- 10 Bergmann RL et al. Diagnostik und Behandlung der Anämie und des Eisenmangels in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Geburtsh Frauenheilk 2009; 69: 682–686
- 11 Dudenhausen J. Eisenmangel rasch identifizieren. Dtsch Arztebl 2010; 107 (25): A-1270
- 12 Milman N, Hertz J. Pregnancy and iron prophylaxis – how and how much? Ugeskr Laeger 2010; 172: 433–436
- 13 Peña-Rosas JP et al. Intermittent oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2015

Dr. med. Pia Ruisinger
Geburtshilfe & Gynäkologie
Klinik Hallerwiese
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
E-Mail: pia.ruisinger@diakonienueuendettsau.de