Die Bekämpfung und Ausrottung der Rindertuberkulose in Deutschland

The Battle Against Cattle Tuberculosis in Germany

Autoren

G. Hünermund, R. Kropp

Bibliografie

DOI 10.1055/s-2006-944284
 Pneumologie 2006; 60: 772–776
 © Georg Thieme Verlag KG
 Stuttgart · New York
 ISSN 0934-8387

Korrespondenzadresse

Dr. med. R. Kropp
 Liegnitzer Straße 5
 36100 Petersberg
 dr.robert.kropp@gmx.de

Serienherausgeber

R. Kropp

Die erste Beschreibung der Tuberkulose des Rindes¹ (Perlsucht², Hirsesucht, auch Franzosenkrankheit³ [1]) findet sich bei Maimonides im 12. Jahrhundert, relativ spät, wenn man bedenkt, dass die Tuberkulose beim Menschen seit dem Neolithikum nachgewiesen ist, bei Tieren (Schweinen) erstmals von Aristoteles beschrieben wurde [2]. Ursachen hierfür sind, dass die Tuberkulose nicht bei primitiven Rinderrassen, sondern erst bei den Kulturrassen (Stallhaltung, also bei engem Kontakt) auftritt und dass die Rindertuberkulose nicht nur als Lungenphthase, sondern eher als Tuberkulose des Euters auffällt und dann der Zusammenhang mit der Lungenphthase nicht leicht erkennbar ist. [3]

Um 1700 galt die Perlsucht (● **Abb. 1**) allerdings schon als eine durchaus häufige Krankheit der Rinder, mit weiterer deutlicher Zunahme in den nächsten Jahrzehnten. Diese Zunahme war nur zum Teil real, sie ist auch durch genauere Untersuchungen der Tiere vor allem seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begründet.⁴ 1890 waren im Deutschen Reich 25% der Rinder perlsüchtig, 15,7% der geschlachteten Rinder tuberkuloseverseucht.⁵ [1] 1901 reagierten 80% der Rinder tuberkulinpositiv.⁶ [3,4] Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Befunde muss nicht eigens betont werden [5]: die Rindertuberkulose bedeutete nicht nur eine Infektionsquelle für den Menschen, vielmehr ließen die Tiere infolge ihrer Krankheit in ihrer Milch- und Fleisch-Produktion nach und konnten auch frühzeitig eingehen.⁷

Eine ausführliche Beschreibung der Rindertuberkulose findet sich bei Fürst [3], Francis [10] und vielen anderen. Der tuberkulöse Primärherd entsteht auch bei Rindern zu 90% in der Lunge; die Infektion der Tiere erfolgt also in erster Linie aerogen, durch infektiöse, „offene“ Tiere im gleichen Stall (oder durch den Menschen). Erst durch

Abb. 1 Perlsucht.

weitere Ausbreitung der Krankheit im infizierten Tier entstehen andere Organtuberkulosen; als in-

¹ Auf die Erkrankung an „Rinder-Tuberkulose“ (Mycobakterium tuberculosis, Typ bovis sive bovinus) bei anderen Tieren, vor allem Pferden, Schweinen, Ziegen, kann hier nicht eingegangen werden (s. [6,7]).

² Perlsucht = Tuberkulose der serösen Häute bei Rindern [15]. Der Name „Perlsucht“ spielt wohl auf das weißlich glänzende Aussehen der subserösen Tuberkuloseherde an.

³ Die Perlsucht wurde seit dem 16. Jahrhundert eine Zeit lang als eine Form der Syphilis angesehen [8].

⁴ 1894/95 belief sich die Gesamtzahl der als tuberkulös befundenen Tiere gemäß der Schlachthaus-Statistik im Königreich Preußen auf 85 218, und zwar 67 984 Rinder, 504 Kälber, 15 877 Schweine, 853 Schafe und Ziegen [9].

⁵ Diese Zahl ist zu optimistisch, weil sie nur die in die Schlachthäuser gelangenden Rinder berücksichtigt [9].

⁶ Einzelheiten, auch andere Länder betreffend, u.a. bei Fürst, S. 69ff [3].

⁷ „Die Rindertuberkulose schädigt den Bauern durch verminderte Milchleistung und geringe Einnahmen aus der Milch, schlechte Gewichtszunahme, kurze Lebensdauer und verminderte Fruchtbarkeit, erhöhte Anfälligkeit der tuberkulosebefallenen Rinder für andere Krankheiten sowie geringe Erlöse aus dem Verkauf des Schlachtviehs infolge schlechter Qualität und Beanstandungen bei der Fleischschau.“ (Informationsblatt „Kampf der Rindertuberkulose auf dem Bauernhof“, 1955, zur Verfügung gestellt vom Deutschen Tuberkulose-Archiv, Fulda (● **Abb. 2**).

Abb. 2 Informationsblatt zur Bekämpfung der Rindertuberkulose.

fektiös gelten die der Gebärmutter, des Darmes und vor allem des Euters. [11]

Die Tuberkulose des Euters entsteht also hämatogen, in der Regel von einer primären Erkrankung der Lunge ausgehend. „Jede Tuberkulose, von der das Eutergewebe ergriffen ist, ist als offene Form der Tuberkulose zu betrachten.“, „Die Diagnose der Eutertuberkulose kann klinisch als gesichert angesehen werden, wenn ein Euterviertel und die zugehörige Euterlymphdrüse schmerzlose, nicht höher temperierte, feste, derbe, knotige Anschwellungen aufweisen.“ [11]

Die Rindertuberkulose ist in Deutschland eine anzeigepflichtige Tierseuche. Heilversuche sind verboten. [12]

Im Rahmen seiner jahrelangen Tuberkuloseforschungen konnte Robert Koch die tuberkulöse Ätiologie der Rindertuberkulose aufdecken. Von mehreren Forschern wurden Befunde zusammengetragen, nach denen die Tuberkulose bei Mensch und Rind durch zwei nahe verwandte Erreger, zwei verschiedene Typen des Mykobakterium tuberculosis, verursacht wurde: den Typus humanus und den Typus bovis oder bovinus. ([3] S. 66; 13, S. 40) Koch sagte in seinem bekannten Vortrag 1882 [14]: „Eine andere Quelle der Tbc. bildet unzweifelhaft die Tbc. der Haustiere, in erster Linie die Perlsucht. Damit ist auch die Stellung gekennzeichnet, welche die Gesundheitspflege in Zukunft gegenüber der Frage nach der Schädlichkeit des Fleisches und der Milch von perlsüchtigen Tieren einzunehmen hat. Die Perlsucht ist identisch mit der Tuberkulose des Menschen und also eine auf diesen Menschen übertragbare Krankheit.“

Eine Tuberkulose-Erkrankung des Menschen durch Mykobakterium tuberculosis Typ bovinus zeigt das gleiche Krankheitsbild wie eine durch den Typ humanus; eine Unterscheidung ist lediglich mithilfe der Typenbestimmung möglich. Die Rindertuberkulose ist üblicherweise zwischen Menschen nicht infektiös. Der Erreger muss also vom Tier (Rind) stammen und wird überwiegend durch den Genuss bakterienhaltiger Milch übertragen. [7,16,17] Der Primärherd findet sich beim Menschen demnach nicht in der Lunge, sondern im Intestinum.

Später konnte Koch nachweisen, dass bei entsprechenden Versuchen eine Tuberkuloseinfektion des Rindes durch menschliche Tuberkulose-Erreger (Typus humanus) nicht möglich sei und dass eine humane Tuberkulose trotz häufigen Genusses in-

fizierter Milch (Typus bovinus) selten auftrete. Hieraus schloss er, im Gegensatz zu seiner ursprünglichen Auffassung, „... dass die menschliche Tuberkulose von der Rindertuberkulose verschieden ist ...“, „dass die schädliche Wirkung der Perlsuchtmilch und ihrer Produkte auf den Menschen nicht erwiesen ist“, und dass es nicht vorrangig sei, „irgendwelche Maßnahmen dagegen (gegen die Perlsucht)⁸ zu ergreifen“. [18,19] Dieser Einschätzung wurde vehement widersprochen, sie wurde in der Folge widerlegt. [20–22,37]

Die außerordentlich umfangreiche wissenschaftliche Beschäftigung mit der Tuberkulose vor allem im Anschluss an die Kochsche Entdeckung des Tuberkulose-Erregers im Jahre 1882 führte zu einer intensiven gegenseitigen Befruchtung und Zusammenarbeit zwischen Veterinär- und Human-Medizin. So wurde die diagnostische Nutzung der Tuberkulinprobe bei Rindern schon vor der Jahrhundertwende 1900 beschrieben [3,5,11]; die Tuberkulintestung war damals das einzige sichere diagnostische Verfahren. [6] Über falsch positive und falsch negative „Tuberkulinreaktionen“ wurde berichtet, eine staatliche „Kontrolle der Keimfreiheit und der Bestimmung der Wertigkeit“ der im Handel befindlichen Tuberkuline gefordert. [5] Gestritten wurde über deren Anwendung, ob subkutan oder intravenös (!). Insgesamt schälte sich die intrakutane Tuberkulinprobe als diagnostische Methode der Wahl heraus.

Im Vordergrund aller Bestrebungen zur methodischen Bekämpfung der Rindertuberkulose, als deren Begründer Bernhard Bang anzusehen ist, standen bei der Häufigkeit der Krankheit natürlich die Bemühungen, die Rindertuberkulose auszumerzen. [22] Um 1900 standen sich zwei Vorschläge hierzu gegenüber. Von Ostertag forderte die einmal jährliche klinische Untersuchung aller Rinder sowie die Erfassung und Tötung der Bakterienausscheider (das „von Ostertagsche“, das „deutsche Verfahren“ [11,15]). Hingegen waren die Forderungen Bangs wesentlich radikaler. Er forderte („Bangsches Verfahren“ [15,23]):

1. Tuberkulinisierung des gesamten Rinderbestandes
2. Getrennte Haltung tuberkulinpositiver und -negativer Tiere sowie Ausschaltung der ersteren von der Milchproduktion⁹ und ihre allmähliche Tötung
3. Vollständige tuberkulosefreie Aufzucht der Kälber
4. Regelmäßige Kontrolltuberkulinisierung der gesamten Herde [24].

Auf getrennten Experimenten Bangs, Kochs und von Behrings beruhende Versuche, die Rinder mittels Applikation von Tuberkulosebakterien oder Tuberkulin gegen die Tuberkulose zu immunisieren, also zu impfen, waren nicht erfolgreich. [25–27]. Verschiedene Möglichkeiten, die Milch keimfrei zu machen,¹⁰ wurden erprobt, so die Anwendung ultraviolett Lichtes, chemischer Substanzen, vor allem die Pasteurisierung der Milch durch Erhitzen. [13] Diese Methode war nicht unbestritten; man fürchtete den Verlust an Vitaminen und sonstigen wertvol-

⁸Anmerkung der Autoren.

⁹„Kühe mit klinisch erkennbarer Tuberkulose (Husten, chronischer Durchfall, Abmagerung, Eutertuberkulose etc.) oder mit okkulten Tuberkulose aber positiver Reaktion (auf Tuberkulin, d. Verf.) sind sofort aus dem der Milchgewinnung dienenden Stall zu entfernen, von den Milchkühen zu isolieren, für die Zucht nicht zu verwenden, am besten zu schlachten.“ [3]

¹⁰In der Milch bleiben die Tuberkulosebakterien auch nach 15 Tagen virulent, in Süßrahmbutter noch nach 4 Wochen; in Weich- und Hartkäse sind sie erst nach Monaten abgestorben [6].

len Inhaltsstoffen. [15] Erst seit 1947 musste die verkaufte Milch in Deutschland pasteurisiert sein.¹¹ [28]

Hinzu kamen staatliche Maßnahmen; dies beweist die Bedeutung und Dringlichkeit der Bekämpfung der Rindertuberkulose schon aus damaliger Sicht. Hier ist als erstes das Reichsviehseuchengesetz vom 26. Juni 1906 zu nennen.¹² In ihm wurde für bestimmte Formen der Tuberkulose die Anzeigepflicht eingeführt. Kennzeichnung und Absonderung der Tiere sowie Behandlung bzw. Verwendungsverbot der Milch wurden geregelt. Rinder mit „offener“ Tuberkulose, d. h. äußerlich erkennbarer Erkrankung, wurden seit 1912 getötet. [22, 29]

Gemäß der „Kaiserlichen Verordnung über die Hauptmängel und Gewährsfristen im Viehhandel“ vom 27. März 1899 wurde die Tuberkulose als Gewährsmangel im Lebendviehhandel und als Hauptmangel beim Handel mit Schlachttieren eingestuft, wenn die Tuberkulose eine allgemeine Beeinträchtigung darstellte bzw. das Tier nur bedingt als Nahrungsmittel für den Menschen geeignet war. Vergleichbare Bemühungen gab es natürlich auch in anderen Ländern. [42]

Alle diese Bemühungen waren nur teilweise, nur ungenügend erfolgreich. So wurden noch 1936 in Preußen in 45 945 Beständen 412 184 Rinder einem Tuberkulintest unterzogen. Von ihnen reagierten 128 900 Tiere positiv (31,27%). [29]

In bis zu 35% der untersuchten Milchproben ließen sich Tuberkulosebakterien finden, in bis zu 18% auch in pasteurisierter Milch. ([18, 30]; s. 7) (Unklar bleibt bei der zweiten, erschreckenden Prozentzahl, ob es sich um lebende oder schon abgetötete Tuberkulosebakterien handelte.)

Die Rindertuberkulose war weiterhin eine bedeutsame Infektionsquelle für den Menschen. Nach Möllers [21] waren 10,21% von über 93 000 menschlichen Tuberkulose-Erkrankungen der Jahre 1928–1952 durch den Typus bovinus verursacht; hieran starben jährlich etwa 1000 Menschen. Von den Neu-Erkrankungen an Tuberkulose des Jahres 1949 erkrankten 10% durch den Typus bovinus, von denen 1800 Patienten starben [4]. 1954 wurde bei 12,5% an Tuberkulose Erkrankter der Typus bovinus gefunden. [28] Etwa 50% der Kindertuberkulosen waren durch den Typus bovinus bedingt, [4]

Ähnliche Erfahrungen wurden auch in anderen Ländern gewonnen. [1, 7, 28, 31, 32] Im Jahre 1934, vor Beginn der dortigen systematischen Bekämpfung (Verfahren nach Bang), ermittelte die schweizerische Fleischbeschaustatistik bei einheimischem Schlachtvieh, dass 23,8% der Kühe von Tuberkulose befallen waren. [33] Die jährlichen Schäden durch die Rindertuberkulose wurden für 1937 auf 350 Millionen Reichsmark beziffert. [29]

Langsam wurde in Deutschland einsichtig, dass alle bisherigen Maßnahmen der vergangenen fünf Jahrzehnte, vor allem Impfungen und die Ausmerzung der an fortgeschrittener Tuberkulose leidenden Rinder („von Ostertagsches Verfahren“)¹³, ungenügend waren und nur ein radikales Vorgehen erfolgreich sein könne. [34] Mit dem „Bangschen Verfahren“ hatten die skandinavischen Länder, Großbritannien und die USA schon vor dem

Abb. 3 Intrakutane Tuberkulintestung nach Mendel-Mantoux beim Rind.

Zweiten Weltkrieg gute Erfahrungen gesammelt. [28] Dass man sich in Deutschland erst spät, nach dem Zweiten Weltkrieg, zu diesem Vorgehen entschloss, hatte unter anderem wirtschaftliche Gründe; außerdem hatte man zu große Hoffnungen auf die Sterilisierung der Milch gesetzt. [15]

1952 begann man in der Bundesrepublik mit einem freiwilligen, staatlich gelenkten und staatlich anerkannten Procedere gemäß der Methode nach Bang, die Rindertuberkulose zu tilgen. Voraussetzung eines solchen konzertierten Vorgehens waren gesetzliche Regelungen, die den einzelnen Bundesländern zukamen.¹⁴

Alle Rinder wurden in etwa dreijährigem Rhythmus tuberkulintestet; dies geschah durch intrakutane Applikation (Testung nach Mendel-Mantoux) (● **Abb. 3**) zweier Tuberkuline, „Rindertuberkulin-PPD für Tiere“ (Mykobakterium bovis) und „Geflügel-PPD für Tiere“ (Mykobakterium avium; Test zur Feststellung der Tuberkulose beim Geflügel und zur Durchführung der vergleichenden Tuberkulinprobe beim Rind) (● **Abb. 4**). Eine Rindertuberkulose wurde angenommen, wenn der erstgenannte Test deutlich stärker positiv ausfiel als der zweite [41]. Die tuberkulinpositiven Rinder wurden von den gesunden separiert und geschlachtet („Bangsches Verfahren“; siehe oben).

Hinzu kamen flankierende Maßnahmen:

- Teilweise staatliche finanzielle Hilfen,
- Bessere Bezahlung der Milch aus tuberkulosefreien Beständen,
- Die Möglichkeit, ein Schild „Tuberkulosefreier Rinderbestand“ oder „Staatlich anerkannter tuberkulosefreier Bestand“ außen am Stall anzubringen (● **Abb. 5**).

¹¹ Nicht-pasteurisierte Vorzugsmilch musste sicher tuberkulosefreien Kühen entstammen.

¹² Reichsgesetzblatt 1906, S. 519f.

¹³ Das „von Ostertagsche Verfahren“ wurde in Deutschland 1939 eingestellt [6].

¹⁴ Z.B.: „Erste und zweite Durchführungsverordnung der Viehseuchenanordnung zur Bekämpfung der Rindertuberkulose“ (Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 17.3.1951); Erlass betr. „Freiwilliges staatliches Tuberkulosebekämpfungsverfahren“ (Niedersächsisches Amtsblatt NS S 400 vom 23.11.1950); „Neufassung der Verordnung zum Schutz gegen die Tuberkulose des Rindes“ vom 12.5.1952 (Nordrhein-Westfalen); „Landesverordnung über die Bekämpfung der Tuberkulose des Rindes“ vom 28.10.1950 (GVBl S 299; Rheinland-Pfalz); „Anordnung zur Bekämpfung der Rindertuberkulose“ vom 7.5.1951 (Amtsblatt Schleswig-Holstein S. 231).

Abb. 4 Zur Tuberkulintestung verwendete Tuberkuline mit Spritze.

Tab. 1 Inzidenz (Neuerkrankungen) an Rindertuberkulose (Befallene Gehöfte pro Jahr) 1990 – 2002 [Bundesrepublik Deutschland, Tierseuchenberichte – Jahresstatistik, Inzidenz]

Jahr	Gehöfte
1990	12
1991	5
1992	5
1993	7
1994	14
1995	6
1996	9
1997	6
1998	2
1999	2
2000	4
2001	4
2002	4

Erinnerungen eines betroffenen Landwirts (F. H.)

„Seit Anfang der fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden meine Milchkühe in dreijährigem Rhythmus von vereidigten Veterinären („Tierwert-Testern“, „Tuberkulinisierungs-Ärzten“) tuberkulinisiert (tuberkulingetestet). Dies geschah etappenweise, pro Jahr kam $\frac{1}{3}$ des Bestandes an die Reihe. Die Testung erfolgte an der rechten oder linken Schulter des Rindes als Einspritzung der Tuberkuline mittels einer speziellen Spritze in die Haut. Vor und 72 Stunden nach Anlegen des Testes wurde die Hautdicke im Testbereich mit einem besonderen Gerät (wie eine Schublehre) gemessen. Nicht eindeutige Ergebnisse wurden sechs Wochen später nachgetestet.

Tuberkulinpositive Rinder wurden isoliert und gekeult (geschlachtet). Dieser Prozess wurde auf mehrere Jahre verteilt, um wirtschaftliche Schäden, welche trotz der staatlichen Unterstützung nicht zu vermeiden waren, in Grenzen zu halten. Denn ein größerer Teil des Rinderbestandes ging auf diese Weise verloren; es dauerte Jahre, bis er seinen früheren Stand wieder erreichte. Anschließend konnte der Bauernhof die Bezeichnung „tuberkulosefrei“ führen. Tuberkulin-Nachtestungen erfolgten in dreijährigem Turnus bis 1997.“

Abb. 5 Schild „Tuberkulosefreier Rinderbestand“.

Abb. 6 Dr. Hl. Georg. Motivbild zur Tuberkulosebekämpfung.

Diese Aktion kostete bundesweit etwa zwei bis zweieinhalb Milliarden D-Mark. [4] Durch sie gelang es, die Tuberkulose der Rinder auszurotten. Innerhalb weniger Jahre ging die Inzidenz der Rindertuberkulose dramatisch zurück, nur Einzelfälle wurden noch diagnostiziert (● **Tab. 1**). Zu Beginn der staatlichen Tuberkulose-Bekämpfungskampagne im Jahre 1952 waren nur ca. 10% aller Betriebe mit ca. 9% aller Tiere anerkannt tuberkulosefrei. Fünf Jahre später war der Anteil bereits auf 74% gestiegen. Ende 1961, als das Eradikationsprogramm beendet wurde, waren es ca. 99,7% aller Betriebe mit 99,6% aller Tiere. [12] Zahlen aus einem großen bakteriologischen Labor über die Häufigkeit des *M. bovis*-Nachweises zwischen 1973 und 2001 enthält die ● **Tab. 2**. [35]

Ab 1962 galt die Rindertuberkulose in Deutschland als ausgerottet, besiegt, wie auf der Grünen Woche am 27.01.63 bekanntgegeben wurde. [4] 1977 befand die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Bundesrepublik für frei von Rindertuberkulose.¹⁵ Die

¹⁵ „amtlich frei von boviner Tuberkulose“ bedeutet: > 99,9% der Bestände frei von Tuberkulose.

Tab. 2 Untersuchungsfrequenz und Anzahl der gefundenen *M. bovis*-Stämme 1973–2001 [35]

Periode	Zahl der untersuchten Proben	Zahl der <i>M. bovis</i> -Stämme
1973–1977	86 300	74
1978–1982	81 400	32
1983–1987	52 900	11
1988–1992	37 000	9
1993–1997	42 900	6
2000	6569	1
2001	6137	3

DDR machte eine ähnliche Prozedur durch. Sie galt seit 1978 amtlich als tuberkulosefrei. Nach der Wiedervereinigung wurde die gesamte Bundesrepublik 1997 von der WHO endgültig als frei von Rindertuberkulose erklärt. [36]

In der Ausrottung der Rindertuberkulose ist die Bewältigung eines gesundheitlichen Problems allerersten Ranges zu sehen. [39,40]

Danksagung

Die Abbildungen wurden vom Deutschen Tuberkulose-Archiv, Fulda zur Verfügung gestellt. Wir danken dem Archiv für seine Unterstützung.

Literatur

- 1 Rieck. Die Tuberkulose unter den Rindern auf dem Schlachthofe zu Leipzig in den Jahren 1888–1891. Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde; Band XIX: 1ff–, zitiert nach D. Voges
- 2 Karasszon D. Robert Kochs Forschungen zur Rinder-Tuberkulose. In: Kaiser W, Hübner H: Robert Koch (1843–1910). Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: Hallesches Symposium 1982; 1983: 111ff
- 3 Fürst L. Die intestinale Tuberkulose-Infektion mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. Stuttgart: F. Enke Verlag; 1905
- 4 Buchwald G. Der Rückgang der Schwindsucht trotz „Schutz“-Impfung. München: F. Hirthammer Verlag; 2002
- 5 Eber A. Tuberkulinprobe und Tuberkulosebekämpfung beim Rinde. Berlin: Verlag P. Parey; 1898
- 6 Roeingh K-T. Die Bedeutung der Großvieh-Tuberkulose für die Epidemiologie der Tuberkulose des Menschen. Veröffentlichungen der Akademie für Staatsmedizin Düsseldorf, Jahrbuch 1952 Düsseldorf: Andreas & Hans Hofbauer, Druckerei und Verlag;
- 7 Trautwein K. Vorkommen und Bedeutung der Tuberkulose der Haustiere. In: „Neuere Tuberkuloseforschung I“. Tuberkulose-Bücherei. Stuttgart: G. Thieme Verlag; 1949
- 8 Rosenberger G. Krankheiten des Rindes. 2. Auflage. Berlin/Hamburg: Verlag Paul Parey; 1978: 856–871
- 9 Voges D. Der Kampf gegen die Tuberkulose des Rindviehs. Jena: Gustav Fischer Verlag; 1897
- 10 Francis J. Bovine tuberculosis including a contrast with human tuberculosis. London: Staples Press Ltd; 1947
- 11 Ostertag R von. Die Bekämpfung der Tuberkulose des Rindes. Berlin: Verlag Richard Schoetz; 1913
- 12 Moser I. Die Tuberkulose des Rindes in Deutschland: Geschichte, aktuelle Bedeutung und Diagnostik. Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle; 12, 2, 2005
- 13 Kathe J. Die Bedeutung der Rindertuberkulose für die Tuberkulose des Menschen. In: Reimer H. Grundlagen für die Bekämpfung der Rindertuberkulose. Berlin: Deutscher Bauernverlag; 1956
- 14 Koch R. Die Aetiologie der Tuberculose. Berliner klinische Wochenschrift 19, 1882: 221–230

- 15 Orland B. Handeln in Zeiten der Ungewissheit. Tuberkulose, Milch und Tierseuchenbekämpfung im 19. und 20. Jahrhundert. Internationaler Arbeitskreis für Kulturforschung des Essens; Mitteilungen Heft 8 Mai 2001
- 16 Müller RW. Über die bovine Tuberkulose des Menschen. In: „Neuere Tuberkuloseforschung I“. Tuberkulose-Bücherei. Stuttgart: G. Thieme Verlag; 1949
- 17 Koch R. Übertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen. Deutsche Medicinische Wochenschrift 28, 1902; Nr. 48: 857–862
- 18 Bisping W. Zur Geschichte der Bekämpfung der Rindertuberkulose. Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift 1998; 111: 362–367
- 19 Goerttler V, Weber E. Bovine Tuberkulose als Ursache humaner Tuberkulose. Stuttgart: Verlag Ferdinand Encke; 1954
- 20 Graffmann-Weschke K. Lydia Rabinowitsch-Kempner (1871–1935). Leben und Werk einer der führenden Persönlichkeiten der Tuberkuloseforschung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Berlin: Dissertation; 1997
- 21 Möllers B. „Die Tuberkulose“. In: Kolle/Kraus/Uhlenhuth. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen.; Band V, 1928
- 22 Deutscher Landwirtschaftsrath. Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose des Rindviehs. Bericht über die XX. Plenarversammlung 1892. Berlin: Druck von Leonhard Simion; 1892
- 23 Bang B. Über die Eutertuberkulose der Milchkühe und über tuberkulöse Milch. Deutsche Zschr f. Tiermed 1885; 11: 45
- 24 Franzenburg H-P. Die Ursachen der Reinfektion bei den Wiederholungsuntersuchungen auf Rindertuberkulose in Hamburg. Monatshefte für Tierheilkunde 9, Sonderteil „Die Rindertuberkulose“ 1957: 42–48
- 25 Bang B. Die Verwendung des Tuberkulins in dem Kampfe gegen die Tuberkulose. Dtsch Zschr Tiermed 1896; 22: 1–31
- 26 Behring E von. Die Jennerisation als Mittel zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. Zschr f. Tiermed 1902; Heft 5–6: 321
- 27 Gilliland SH. The results obtained in the eradication of tuberculosis from a herd by the use of tuberculosis vaccine and the Bang system. Amer Vet Review 1912; 40: 437
- 28 Ickert F. Über die bovine Tuberkulose beim Menschen. Der Landarzt 1954; 30: 556
- 29 Müssemeier, Zeller. Die Fütterungstuberkulose vom veterinärärztlichen Standpunkt aus. In: Die Fütterungstuberkulose im Kindesalter Wien: 47. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde; 1940
- 30 Kröger, Möhlenkamp. Ärztliche Wochenschrift 1950: 785
- 31 Atkins P, Durham J. Persönliche Mitteilung.
- 32 Pippert K, Quander J, Meyn A. Bekämpfung der Rinder-Tb und der Abortus-Bang-Infektion in Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz. Land- und Hauswirtschaftlicher Auswertungs- und Informationsdienst; Heft 38 Frankfurt am Main: Verlag Kommentator GmbH; 1953
- 33 Andres J. Die Tuberkulose des Rindes. Eine Aufklärungsschrift für Landwirte, Züchter, Viehhändler usw., über das Wesen und die Bekämpfung der Rindertuberkulose. Thun: Ott Verlag; 1951
- 34 Weyl A. Neue Wege zur Bekämpfung der Tuberkulose des Rindes. Hannover: Verlag M. & H. Schaper; 1950
- 35 Rau-Berger H, Dr. rer. nat. Persönliche Mitteilung.
- 36 Girndt L. Ein Beitrag über die vertragliche Gewährleistung „Tuberkulosefreiheit“ bei Rindern Monatshefte für Tierheilkunde. Sonderteil „Die Rindertuberkulose“. 1957; 9: 37–42
- 37 Dammann C, Rabinowitsch L. Die Impftuberkulose des Menschen, zugleich ein Beitrag zur Identitätsfrage der von Mensch und Rind stammenden Tuberkelbazillen. Zeitschrift für Tuberkulose 1908; 12: 441–455
- 38 Behring E von. Über alimentäre Tuberkulose-Infektion im Säuglingsalter. Brauers Klinik der Tuberkulose 3 1904; Heft 2
- 39 O'Reilly LM, Daborn CJ. The epidemiology of Mycobacterium bovis infections in animals and man: a review. Tubercle and Lung Disease 1995; 76 Suppl. 1
- 40 Myers JA. Man's greatest Victory over Tuberculosis. Springfield/Baltimore: C. C. Thomas; 1940
- 41 Littlejohn A. The combined tuberculin test for cattle. Journal of comparative Pathology and therapeutics. 1908; 22: 217–237
- 42 Waddington K. The science of cows: meat, bovine tuberculosis and the British State, 1880–1911. History of Science 2001; 39: 355–381