

Zusatzmaterial

► **Tab.4** Absolute und relative Häufigkeiten von berichteten Symptomen der 132 Patienten zum Vorstellungszeitpunkt im Vergleich zwischen ehemals ambulant und stationär behandelten Patienten. P-Werte wurden mittels 2-seitigen Fisher's-exact-Tests erhoben.

Symptom	alle n (%)	stationär Behandelte n (%)	ambulant Behandelte n (%)	OR (95 %-KI)	p-Wert
Fatigue	108/132 (82 %)	41/53 (77 %)	67/79 (85 %)	0,61 (0,23–1,65)	0,357
Dyspnoe unter Belastung	80/131 (61 %)	34/53 (64 %)	46/78 (59 %)	1,24 (0,57–2,74)	0,588
Dyspnoe in Ruhe	5/130 (4 %)	3/52 (6 %)	2/78 (3 %)	2,32 (0,26–28,60)	0,389
Brustschmerz/Thoraxschmerz	37/131 (28 %)	9/53 (17 %)	28/78 (36 %)	0,36 (0,14–0,91)	0,019
Gelenkschmerz	29/130 (22 %)	20/52 (38 %)	9/78 (12 %)	4,79 (1,82–13,20)	<0,001
Muskelschmerz	28/124 (23 %)	15/52 (29 %)	19/78 (24 %)	1,26 (0,52–2,98)	0,684
Kopfschmerz	44/131 (34 %)	14/53 (26 %)	30/78 (38 %)	0,57 (0,24–1,31)	0,188
Riech-/Geschmacksstörungen	46/131 (35 %)	10/53 (19 %)	36/78 (46 %)	0,27 (0,10–0,65)	0,002
Sehverlust/Sehstörungen	36/131 (27 %)	18/53 (34 %)	18/78 (23 %)	1,71 (0,73–4,00)	0,231
Hörverlust	23/131 (18 %)	11/53 (21 %)	12/78 (15 %)	1,44 (0,52–3,93)	0,486
Gleichgewichtsstörung	36/130 (28 %)	18/52 (35 %)	18/78 (23 %)	1,76 (0,75–4,12)	0,166
Konzentrationsstörungen	71/131 (54 %)	31/53 (58 %)	40/78 (51 %)	1,34 (0,63–2,88)	0,477
Gedächtnisprobleme	51/94 (54 %)	20/35 (57 %)	31/59 (53 %)	1,20 (0,48–3,06)	0,675
Schlafstörungen	49/113 (43 %)	13/42 (31 %)	36/71 (51 %)	0,43 (0,18–1,04)	0,050
Haarausfall	44/128 (34 %)	23/52 (44 %)	21/76 (28 %)	2,08 (0,92–4,66)	0,061
Sicca-Syndrom	37/113 (33 %)	16/45 (36 %)	21/68 (31 %)	1,23 (0,51–2,95)	0,684