

Refresher-Fragen

Testen Sie Ihr Wissen zum Thema „**Folgen von Handgelenksverletzungen beim alten Menschen**“. Es ist immer nur eine Antwort richtig! Viel Erfolg!

Frage 1

Welches Syndrom zählt nicht zu den Geriatrischen Giganten?

- A Gebrechlichkeit
- B Sarkopenie
- C Anorexie
- D Chronische Schmerzen
- E Kognitive Dysfunktion

Frage 2

Welche Aussage ist falsch? Behandlungsmaßnahmen am alten Menschen unterscheiden sich von der Behandlung jüngerer Patienten durch ...

- A den Umfang von Begleiterkrankungen.
- B die veränderte Anatomie der Hand.
- C die höhere postoperative Komplikationsrate.
- D das Umfeld der sozialen Rehabilitation.
- E ethische Fragen im Hinblick auf eine Operation

Frage 3

Welche Aussage ist falsch? Der Handtherapeut sollte in der Behandlung älterer Menschen Folgendes besonders beachten:

- A Die Altershaut ist verletzungsanfälliger.
- B Muskeln und Gelenke brauchen eine längere Vorbereitungszeit.
- C Der Erhalt der Gesamtmobilität hat einen großen Stellenwert.
- D Die Schmerzschwelle ist erhöht.
- E keine Gruppenbehandlungen

Frage 4

Welche Aussage trifft zu? Altersphysiologische Veränderungen ...

- A sind durch angemessene Bildungsreize beeinflussbar.
- B sind gleichzusetzen mit geriatrischen Erkrankungen.
- C betreffen nur das muskuloskelettale System.
- D stellen immer eine Belastung für den Patienten dar.
- E erfordern keine besondere Beachtung.

Frage 5

Was ist keine Ursache einer posttraumatischen Arthrose?

- A Raynaud-Syndrom
- B Radiusfraktur mit Gelenkflächenbeteiligung
- C Skaphoidfraktur
- D Morbus Kienböck
- E Pseudarthrosen

Frage 6

Welche Frakturlokalisierung ist beim Hochbetagten nicht häufig?

- A Distaler Radius
- B Hüftgelenksnah
- C Humeruskopf
- D Fünfter Metacarpalknochen
- E Wirbelkörper

Frage 7

Bei welchem Operationsverfahren werden Skaphoid, Lunatum, Triquetrum und Pisiforme entfernt?

- A Four Corner Fusion
- B Radiolunäre Fusion
- C Proximal Row Carpectomy
- D Radiokarpale Teilarthrodese
- E Palmare Plattenosteosynthese nach Radiusfraktur

Frage 8

Wie lange wird das Handgelenk nach einer mediokarpalen Teilarthrodese in der Regel immobilisiert?

- A Gar nicht, es ist gleich bewegungsstabil
- B Vier Wochen
- C Sechs Wochen
- D Acht Wochen
- E Zwölf Wochen

Frage 9

Welche Aussage bezüglich der DISI (Dorsal Intercalated Segmental Instability) ist falsch?

- A Sie bezeichnet die Fehlstellung des Os lunatum.
- B Der skapholunäre Winkel beträgt mehr als 60°.
- C Sie kann Ursache eines SLAC-Wrist sein.
- D Sie entsteht bei Verletzung des skapholunären Bandes.
- E Das Skaphoid ist dabei nach dorsal subluxiert.

Frage 10

Welches Bewegungsausmaß ist optimalerweise nach einer mediokarpalen Teilarthrodese zu erwarten?

- A 20/0/20
- B 30/0/30
- C 40/0/40
- D 50/0/50
- E 60/0/60